


References

- Aa. Vv. (1995): La Valcamonica. Analisi territoriale da Pisogne a Ponte di Legno (Canonica Valley. A territorial analysis from Pisogne to Ponte di Legno). D. I. S. E. T., Politechnic of Milan, Dept. Urban Eng., Milano (in Italian).
- Aa. Vv. (1997): La Montagna. Valle Canonica-Valle Sabbia-Valle Trompia (The Mountain. Canonica Valley-Sabbia Valley-Trompia Valley). Corbo & Fiore Editori, Venezia (in Italian).
- Aa. Vv. (1999): Itinera (Itinerant). Breno, Vol. 2 (in Italian).
- Aa. Vv. (2003): Guida del Parco del Adamello (A Guide to the Adamello Park). La Cittadina, Gianico (in Italian).
- Āboltiņš O. (1971): Development of the Gauja River valley. Riga (in Russian).
- Abbot G. (1909): Excursion to Eridge and Tunbridge Wells. Proceedings of the Geologists Society 21: 207–209.
- Abrams M. D., van den Gevel S., Dodson R. C. and Copenheaver C. A. (2000): The dendroecology and climatic impacts for old-growth white pine and hemlock on the extreme slopes of the Berkshire Hills, Massachusetts, USA. Can. J. Bot. 78: 851–861.
- Adamovič J. (1994): Paleogeography of the Jizera Formation (Late Cretaceous sandstones), Kokořín area, central Bohemia. Sbor. Geol. Věd, Geol. 46: 103–123.
- Adamovič J. (1997): Vývoj poznání geologické stavby západní části VVP Ralsko (Geology of the Ralsko military reserve – past and present). Bezděz, Česká Lípa 5: 85–146 (in Czech).
- Adamovič J. (2001): Ferruginization in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin. Ph. D. Thesis, Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, Prátrur, 148 pp.
- Adamovič J. (2002a): Occurrences of Fe-oxyhydroxides in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin. In: Adamovič J. and Čílek V. (eds.), Ironstones, Pseudokarst reports 2, Knihovna České speleologické společnosti, Praha, Vol. 37, pp. 7–40.
- Adamovič J. (2002b): Sedimentary rocks. In: Čílek V. (ed.), Encyclopedia of life support systems (EOLSS), Earth system: History and natural variability, Oxford University Press, Oxford, UK [<http://www.eolss.net>].
- Adamovič J. and Čílek V. (eds.) (2002): Železivce české křídové pánve (Ironstones of the Bohemian Cretaceous Basin). Knihovna České speleologické společnosti, Praha, vol. 38: 1–170 (in Czech).
- Adamovič J., Melka K. and Ulrych J. (2001): Fe-oxyhydroxide cementation in Cretaceous sandstones, northern Bohemia: Relation to young volcanic activity. Mitt. Österr. Miner. Ges. 146: 16–17.
- Adamovič J., Ulrych J. and Peroutka J. (2001): Geology of occurrences of ferruginous sandstones in N Bohemia: famous localities revisited. Geol. Saxonica Abh. Mus. Miner. Geol. Dresden 46/47: 105–123.
- Aitkenhead N. (2002): The Pennines and adjacent areas, British Regional Geology Guide 8. British Geological Survey.
- Aldrick J. M. and Wilson P. L. (1990): Land systems of the southern Gulf region, Northern territory. Conservation Committee Northern territory, Australia, technical report 42.
- Almerich J. M., Cruz Orozco J. and Tortosa P. (2001): Espacios Naturales, tierras interiores valencianas. Bromera, Alzira.
- Alpert P. and Stuefer J. (1997): Division of labour in clonal plants. In: de Kroon H. and van Groenendael J. (eds.), The ecology and evolution of clonal plants, Backhuys Publ., Leiden, pp. 137–155.
- Anati E. (1982): I Camuni. Alle radici della civiltà europea (Camunians. The Roots of European Civilization). Jaca Book, Milano (in Italian).
- Anděra M. (1986): Dormice (Gliridae) in Czechoslovakia. Part I. *Glis glis* and *Eliomys quercinus*. Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. Occid, Zool. 24: 3–47.
- Anděra M. and Vohralík V. (1982): Savci Broumovska (Mammals of the Broumovsko region). Lynx, Praha 21: 15–39 (in Czech).
- Andert H. (1929): Die Kreideablagerungen zwischen Elbe und Jeschken. II. Die nordböhmische Kreide zwischen Elbsandsteingebirge und Jeschken und das Zittauer Sandsteingebirge. Abh. Preuss. Geol. Landesanstalt, Neue Folge, Berlin 117: 1–227.
- Andrew F. A. and Hawkins (1999): The Primates of Isalo National Park, Madagascar. Lemur News 4: 10–14.
- Anento J. L., Selfa J. and Jiménez R. (1997): Las saladas de Alcañiz. Estudio interdisciplinar. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Serie Investigación 6. Zaragoza. Annales Scientifiques de la Réserve de Biosphère des Vosges du Nord 1991, 1992, 1993/1994, 1995, 1996, 1997/1998, 1999.
- Annales Scientifiques de la Réserve de Biosphère Transfrontalière Vosges du Nord-Pfälzerwald 2000, 2001, 2002.



SANDSTONE LANDSCAPES

- Anonymus (2000): Sandrock in the Weald. A guide to unique feature and its internationally rare wildlife. Leaflet, High Weald AONB Unit, Flimwell, East Sussex.
- Antonellini M. A., Aydin A. and Pollard D. D. (1994): Microstructure of deformation bands in porous sandstones at Arches National Park, Utah. *J. Struct. Geol.* 16: 941–959.
- Arx J. A. von and Müller E. (1954): Die Gattungen der Amerosporen Pyrenomyzeten. *Beit. zur Krypt. Fl. Schweiz* 11/1: 1–454.
- Ashley G. M. (1990): Classification of large-scale subaqueous bedforms: a new look at an old problem. *J. Sed. Petrol.* 60: 160–172.
- Aslan A., Aptroot A. and Yazici K. (2002): New lichens for Turkey. *Mycotaxon* 84: 277–280.
- Atanassov G. and Goranov A. (1975): Palaeogeography and sediment formation during the Palaeogene in the Eastern Rhodope Mountains. *Geol. Balcanica* 5(1): 73–86.
- Audy M. and Šmídá B. (2005): Crystal eyes. Czech-Slovak expedition to quartzite karst of Venezuelan Guiana. Speleoforum 2003. Česká speleologická společnost, Praha 60–64.
- Augst U. (1998a): Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) im Elbsandsteingebirge. Bericht über ein Artenschutzprojekt in Sachsen. Greifvögel u. Falknerei 1996: 75–88.
- Augst U. (1998b): Der Wanderfalke in Sachsen. In: Rockenbauch D., Der Wanderfalke in Deutschland und Umgebung, Vol. 1, Verlag Christine Hözlzinger Ludwigsburg, pp. 219–231.
- Avise J. C. (2000): Phylogeography: the history and formation of species. Harvard University Press, London.
- Bai T., Maerten L., Gross M. R. and Aydin A. (2002): Orthogonal cross joints: do they imply a regional stress rotation? *J. Struct. Geol.* 24: 77–88.
- Balatka B. (1986): Geomorfologie Chráněné krajinné oblasti Český ráj (Geomorphology of the Bohemian Paradise Protected Landscape Area). Ms., depon. in Bohemian Paradise Protected Landscape Area Administration, Turnov (in Czech).
- Balatka B. and Sládek J. (1984): Typizace reliéfu kvádrových pískovců české křídové pánve (The typology of the relief on block sandstones in the Bohemian Cretaceous Basin). *Rozpravy ČSAV, Řada MPV* 94(6): 1–100 (in Czech).
- Baltsavias E. P. (1999): Airborne laser scanning – existing systems, firms and other resources. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 54: 164–198.
- Barć A., Holeksa J. and Woźniak G. (1995): Zróżnicowanie warstwy runa zbiorowisk leśnych Babiej Góry w gradiencie wysokości (Differentiation of the undergrowth of the forest communities of Babia Góra in altitudinal gradient). In: Mirek Z. and Wójcicki J. J. (eds.), Proceedings of the 50th Congress of the Polish Botanical Society, Kraków, p. 16 (in Polish).
- Barry R. G. (1981): Mountain weather and climate. Methuen, London.
- Bárta J., Helfert Z., Horníčková D. and Lutterer I. (1999): Letem českým světem 1898/1998. Obraz proměny českých zemí v odstupu století. Studio JB Jaroslav, Lomnice nad Popelkou (in Czech).
- Bartnik A. and Tomaszewski E. (1998): Źródła w wybranych zlewniach Kotliny Kłodzkiej (Springs in some catchments in the Kłodzko Basin). *Czasopismo Geograficzne* 69: 323–337 (in Polish).
- Bártová Z., Honců M., Petruš J., Vítáček Z., Vlašina V., Vojtíšek B. et al. (2002): Okres Česká Lípa (Česká Lípa District). In: Mackovčín P., Sedláček M. and Kuncová J. (eds.), Liberecko, Chráněná území ČR (Liberecko region, Protected areas of the Czech Republic), Vol. 3, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, pp. 67–110 (in Czech).
- Battistini R. (1972): Madagascar relief and main types of landscape. In: Battistini R. and Richard-Vindard G. (eds.), Biogeography and Ecology in Madagascar, Dr. W. Junk B. V. Publishers, The Hague, pp. 1–25.
- Bauer L. et al. (1973): Handbuch der Naturschutzgebiete der Deutschen Demokratischen Republik, Vol. 3. Urania Verlag, Leipzig-Jena-Berlin, 278 pp.
- Bauer P. and Härtel H. (2000): Jarní floristická exkurze Severočeské pobočky České botanické společnosti 1999 v Jílovém u Děčína (Spring floristic excursion of the Northern Bohemian branch of the Czech Botanic Society 1999 in Jílové near Děčín). Severočes. Přír., Litoměřice 32: 83–88 (in Czech).
- Beck R. (1897): Erläuterungen zu Blatt Hinterhermsdorf-Daubitz. Leipzig.
- Bednarek R. (1991): Wiek, geneza i stanowisko systematyczne gleb rdzawych w świetle badań paleopedologicznych w okolicach Osia, Bory Tucholskie (The age, origin and classification of rusty soils in the light of paleopedological studies near Os in Bory Tucholskie area). *Rozpravy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika* 1–102 (in Polish).
- Beer V. (2000): Die mikroklimatischen Verhältnisse in der Hinteren Sächsischen Schweiz am Beispiel des Großen Zschandes und ihre Auswirkungen auf die Pflanzenwelt. Thesis, depon. in: TU Dresden, Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften, Tharandt.
- Beer V., Denner M. and Müller F. (2001): Mikroklima und Moosverbreitung in den Sandsteinschluchten der Sächsischen Schweiz. *Ber. Arbeitsgem. Sächs. Bot.*, N. F. 18: 161–205.
- Benito G., Machado M. J. and Sancho C. (1993): Sandstone weathering processes damaging prehistoric rock paintings at the Albaracín Cultural Park, NE Spain. *Environmental Geology* 22: 71–79.
- Beran L. (1998): Molluscs (Gastropoda; Bivalvia) of the wetlands in the Liběchovka and Pšovka brooks basin. *Časopis Národního Muzea, Řada přírodnovědná*, 167(1–4): 43–51.
- Beran L., Bímová K., Hoffmann A., Klein V., Kříž J., Kubíková J., Pořízek L., Šestáková E., Ziegler V. et al. (2005): Chráněná

REFLECTIONS

- krajinná oblast Kokořínsko (Kokořínsko Protected Landscape Area). In: Ložek V., Kubíková J. and Špryňar P. (eds.), Střední Čechy, Chráněná území ČR (Central Bohemia, Protected areas of the Czech Republic), Vol. 13, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, pp. 685–736 (in Czech).
- Berg B. (2000): Litter decomposition and organic matter turnover in northern forest soil. *Forest Ecology and Management* 153: 13–22.
- Berg B. and Ekbohm G. (1991): Litter mass loss rates and decomposition patterns in some needle and leaf litter types. Long-term decomposition in Scots pine forest VII. *Canadian Journal of Botany* 69: 1449–1456.
- Berg B., Ekbohm G. et al. (1996): Some foliar litter types have a maximum limit for decomposition – a synthesis of data from forest systems. *Canadian Journal of Botany* 74: 659–672.
- Berg B., Ekbohm G. and McClaugherty C. (1984): Lignin and holocellulose relations during long-term decomposition of some forest litters. Long-term decomposition in Scots pine forest IV. *Canadian Journal of Botany* 62: 2540–2550.
- Berg B. and McClaugherty C. (2003): Plant litter: Decomposition, Humus formation, Carbone sequestration. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
- Berg B. and Staaf H. (1980): Decomposition rate and chemical changes of Scots pine needle litter II. Influence of chemical composition. *Ecological bulletins* 32: 373–390.
- Berruti G. (1981): Geologia del territorio bresciano (Geology of Brescia Territory). Grato Editore, Brescia (in Italian).
- Beyer O. (1911): Alaun und Gips als Mineralneubildungen und als Ursachen der chemischen Verwitterung in den Quadersandsteinen des sächsischen Kreidegebietes. *Z. Deutsch. Geol. Ges.* 63(4): 429–467.
- Bialecka K. (1982): Rośliny naczyniowe grupy Pilska w Beskidzie Żywieckim (Vascular plants of the Pilsko Massif in the Beskid Żywiecki Mts.). *Zesz. Nauk. Uniw. Jagiellońskiego. Pr. Bot.* 10: 1–149 (in Polish).
- Bilton D. T., Mirol P. M., Macheretti S., Fredga K., Zima J. and Searle J. R. (1998): Mediterranean Europe as an area of endemism for small mammals rather than a source for northwards postglacial colonization. *Proc. R. Soc. London B* 265: 1219–1226.
- Bímová K., Mandák B. and Kašparová I. (2004): How does *Reynoutria* invasion fit the various theories of invasibility. *Journal of Vegetation Science* 15: 495–504.
- Bird E. C. F. (1964): Tor-like sandrock features in the central Weald. Abstract 1156, 20th International Geographical Congress, London.
- Blanck E. (1922): Die ariden Denudations- und Verwitterungsformen der sächsisch-böhmisches Schweiz als Folge organischer Verwitterungsfaktoren im humiden Klimagebiet. *Tharandt. Forstl. Jahrb.*, Berlin 73: 38–60, 93–134.
- Blatt H., Middleton G. and Murray R. (1980): Origin of sedimentary rocks. Ed. 2., Prentice-Hall Inc., Englewood Cliffs.
- Blick T. and Molenda R. (1997): *Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879) first record in Belgium. *Newsl. Br. arachnol. Soc.* 78: 10.
- Bloemers M. C. (1956): Historique de la Protection de la Nature. In: Heim et al. (eds.), Derniers Refuges, Atlas Commenté des Réserves Naturelles dans le Monde, Elsevier, Amsterdam and IUCN, Brussels, pp. 55–61.
- Bondev I. (1991): Rastitelnostta na Bulgaria. Karta v M 1 : 600 000 s obiasnitelen text (The vegetation of Bulgaria. Map 1 : 600 000 with explanatory text). 183 pp. (in Bulgarian). Sofia.
- Boratyński A. (1991): Chorologiczna analiza flory drzew i krzewów Sudetów Zachodnich (Chorological analysis of trees and shrubs in the West Sudety Mts.). Polska Akademia Nauk Instytut Dendrologii, Kórnik, 323 pp. (in Polish).
- Bosák P., Horáček I. and Panoš V. (1989): Paleokarst in Czechoslovakia. In: Bosák et al. (eds.), Paleokarst. Academia-Elsevier, Praha, pp. 107–135.
- Brandsberg J. W. (1969): Fungi isolated from decomposing conifer litter. *Mycologia* 61: 373–381.
- Braun-Blanquet J. and Bolès O. (1957): Les groupements végétaux du bassin moyen de l'Ebre et leur dynamisme. *Anales Est. Exp. Aula Dei* 5(1–4): 1–266.
- Briceno H. O. and Schubert C. (1990): Geomorphology of the Gran Sabana, Guyana shield, southeastern Venezuela. *Geomorphology* 3: 125–141.
- Bristow C. R. and Basley R. A. (1972): Geology of the country around royal Tunbridge Wells. Memoir of the Geological Survey of Great Britain, H. M. S. O., London.
- Bromley R. G. and Mikuláš R. (2002): Sandstone Phenomenon of the East Greenland. In: Kopřivová L. (ed.), Abstract Book, Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14–20 September, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland: p. 2.
- Brown J. F. (1997): Effects of experimental burial on survival, growth, and resource allocation of three species of dune plants. *J. Ecol.* 85: 151–158.
- Brown J. H. and Lomolimo M. V. (1998): Biogeography. Sinauer Ass., Inc., Sunderland.
- Brundu G., Brock J., Camarda I. and Child L. (eds.) (2001): Plant invasions. Species ecology and ecosystem management. Backhuys Publishers, Leiden.
- Brzák P. and Fabiánek O. (1995): Podzemí Šluknovska (The Underground of Šluknov region). Varnsdorf (in Czech).
- Brzák P. and Přibil M. (1999): Podzemní továrny Rabštejn – Jánská (Underground factories in Rabštejn, village Jánská). Krasová deprese, Praha 7: 13–21 (in Czech).
- Buchar J. (1993): Komentierte Artenliste der Spinnen Böhmens (Araneida). *Acta Univ. Carolinae, Biologica* 36 (1992): 383–428.
- Buchar J. and Růžička V. (2002): Catalogue of spiders of the Czech Republic. Peres, Praha.

SANDSTONE LANDSCAPES

- Budai T. and Csillag G. (eds.) (1999): Geology of the Balaton Highland. Geological Institute of Hungary, Budapest, 257 pp.
- Burke M. J. W. and Grime J. P. (1996): An experimental study of plant invasibility. *Ecology* 77: 776–790.
- Busche D. and Sponholz B. (1992): Morphological and micromorphological aspects of the sandstone karst of eastern Niger. In: Nicod J., Pfeffer K. H. and Sweeting M. (eds.), *Geomorphology and geoecology: karst, Zeit für Geomorphologie*, Suppl. 85, pp. 1–18.
- Buzek F., Černý J. and Šrámek J. (1991): Sulphur isotope studies of atmospheric S and the corrosion of monuments in Prague, Czechoslovakia. In: Krouse H. R. and Grinenko V. A. (eds.), *Stable isotopes, natural and anthropogenic sulphur in the environments*, John Wiley & Sons, Chichester, pp. 399–405.
- Buzek F. and Šrámek J. (1985): Sulfur isotopes in the study of stone monument conservation. *Studies in Conservation* 30: 171–176.
- Campeau S. and Rochefort L. (1996): *Sphagnum* regeneration on bare peat surfaces: field and greenhouse experiments. *J. Appl. Ecol.* 33: 599–608.
- Carmichael J. W., Kendrick W. B., Connors I. L. and Sigler L. (1980): Genera of hyphomycetes, 586 pp.
- Carroll S. A. and Walther J. V. (1990): Kaolinite dissolution at 25, 60 and 80 °C. *Am. J. Sci.* 290: 797–810.
- Carson M. A. and Kirkby M. J. (1972): *Hillslope form and Process*. Cambridge University Press, London.
- Castleden R. and Green C. (1999): *Classic landforms of the Dark Peak*. Geographical Association, Sheffield.
- Cebrián R. (1999): *Montañas valencianas. Sierra Espadán*. Centre Excursionista de Valencia, Valencia.
- Čech S. (1989): Upper Cretaceous Didymotis Events from Bohemia. In: Wiedmann J. (ed.), *Cretaceous of the Western Tethys*, Schweizerbart Verlag, Stuttgart, pp. 657–676.
- Čech S. and Gawlikowska E. (1999): Góry Stołowe. Mapa Geologiczno-turystyczna. Adršpašsko-teplické skály. Geologic map for tourists. MOŚZNiL, Państwowy Instytut Geologiczny, Český geologický ústav, Warszawa & Praha (in Polish and Czech).
- Čekstere I. (1994): Gauja National Park. Leaflet, Gauja National Park, Sigulda, Latvia.
- Černosvitov L. (1955): Monografie československých dešťovek (Monograph of Czechoslovak Earthworms). Archiv pro přírodní výzkum Čech 19: 1–86 (in Czech).
- Čeřovský J. (1953): Lesy v Děčínských Stěnách. Návrh na zřízení státem chráněné přírodní oblasti „Děčínské stěny“ (Forests in the Děčínské stěny area. A proposal for declaration of natural reserve „Děčínské stěny“). M. Sc. thesis, Department of Botany, Charles University, Prague (in Czech).
- Čeřovský J. (in press): Historie územní ochrany přírody v ČR (The history of territorial nature conservation in the Czech Republic) (in Czech).
- Čeřovský J. and Härtel H. (2000): The Bohemian-Saxonian Switzerland. *IUCN Newsletter Central and Eastern Europe*, IUCN Praha, Tilburg and Gland: 21(34): 5–7.
- Chadwick D., Ineson P., Woods C. and Pearce T. (1998): Decomposition of *Pinus sylvestris* litter in litter bags: Influence of underlying native litter layer. *Soil Biology and Biochemistry* 30(1): 47–55.
- Chalcraft D. and Pye K. (1984): Humid tropical weathering of quartzite in southeastern Venezuela. *Zeitschrift für Geomorphologie* 28: 321–332.
- Chaloupková K. (1995): Pylová analýza v Adršpašsko-teplických skalách. (Pollen analysis in the Adršpašsko-teplické skály Cliffs). M.Sc. thesis, depon. in: Katedra botaniky PřF UK, Praha. (in Czech).
- Chan M. A., Parry W. T. and Bowman J. R. (2000): Diagenetic hematite and manganese oxides and fault-related fluid flow in Jurassic sandstones, southeastern Utah. *AAPG Bull.* 84: 1281–1310.
- Chape S., Blyth S., Fish L., Fox P. and Spalding M. (comps.) (2003): 2003 United Nations List of Protected Areas. IUCN Gland and UNEP-WCMC Cambridge, ix + 44 pp. + CD ROM.
- Chilvers G. A. and Burdon J. J. (1983): Further studies on a native Australian eucalypt forest invaded by exotic pines. *Oecologia* 59: 239–245.
- Chotěbor P. (1986): Komplexní povrchový průzkum hradu Valečova (Complex surface survey in the area of the Valečov Castle). Památky archeologické, Praha 77: 177–196 (in Czech).
- Chronic H. (1990): *Roadside geology of Utah*. Mountain Press Publishing Co., Missoula.
- Chvátalová A. (2001): Hydrologická charakteristika (Hydrological characteristics). In: Šutera V., Kuncová J. and Vysoký V. (eds.), Labe. Příroda dolního českého úseku řeky na konci 20. století (Elbe. Nature in the lower Czech part of the river at the end of 20th century). AOS Publishing, Ústí n. L.: pp. 41–47 (in Czech).
- Chytíl J. and Hakrová P. (eds.) (2001): Wetlands of the Czech Republic – the list of wetland sites of the Czech Republic. Czech Ramsar Committee, Mikulov.
- Cigna A. A. (1978): A Classification of Karstic phenomena. *Int. J. Speleol.* 1: 352–361.
- Cigna A. A. (1985): Some remarks on phase equilibria of evaporites and other karstifiable rocks. *Le Grotte d'Italia* 12: 201–208.
- Cílek V. (1995): Podzemní Praha (The Underground of Prague). Knihovna České speleologické společnosti, Praha 27: 1–350 (in Czech).
- Cílek V. (1998a): Fyzikálně-chemické procesy vzniku pískovcového pseudokrasu (Physical-chemical processes of pseudocarst origin). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), *Pískovcový fenomén: klima, život a relief*, Knihovna České speleologické společnosti, Praha 32: 134–153 (in Czech).
- Cílek V. (1998b): Sandstone phenomenon: antagonism between surface hardening and salt weathering. In: Sulovský P. and

REFERENCES

- Zeman J. (eds.), Enviweath 96, Environmental Aspects of Weathering Processes, Folia Fac. Sci. Univ. Mas. Brun., Geologova, Brno 39: 33–38.
- Cílek V. (1999): Morfologická klasifikace železitých poloh v pískovcích České krídové tabule (Morphological character of ferruginous occurrences in sandstones of the Bohemian Cretaceous Basin). Ms. (depon. Knihovna České speleologické společnosti, Praha) (in Czech).
- Cílek V. (2000a): The Holocene sedimentation in sandstone rockshelters of northern Bohemia. Geolines, Praha 11: 66–69.
- Cílek V. (2000b): Výzkumy v pískovcovém pseudokrasu Českého Švýcarska (The research of sandstone pseudokarst of Bohemian Switzerland). Speleo, Praha 29: 20–25 (in Czech).
- Cílek V. (2000c): Kumerské pohoří: výzkum pískovcových převisů a pseudokrasu (The research of sandstone rockshelters and pseudokarst in Hradčany area). Speleo, Praha 31: 15–23 (in Czech).
- Cílek V. (2002): Occurrences of ironstones and ferruginous rocks outside the Bohemian Cretaceous Basin. In: Adamovič J. and Cílek V. (eds.), Ironstones, Pseudokarst reports 2, Knihovna České speleologické společnosti, Praha 37, pp. 64–69 (in Czech).
- Cílek V. (2003): Vznik a typologie pískovcových převisů: výzkumy v Labských pískovcích (Formation and typology of sandstone overhangs: research in the Elbe Sandstones). In: Belisová N. (ed.), Minulost Českého Švýcarska I. (Past of the Bohemian Switzerland I, Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, pp. 7–22 (in Czech).
- Cílek V., Jarošová L., Ložek V., Svoboda J., Škrdla P. and Karlík M. (1996): Výzkum pískovcových převisů v sz. části CHKO Kokořínsko (Research of sandstone rock shelters, NW part of Protected Landscape Area Kokořínsko). Ochrana přírody, Praha 51/2: 43–47, 51/3: 82–85, 51/4: 104–108 (in Czech).
- Cílek V. and Kopecký J. (eds.) (1998): Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf (Sandstone phenomenon: climate, life and relief). Knihovna České speleologické společnosti, Praha & Broumov, Vol. 32, pp. 1–174 (in Czech).
- Cílek V., Langrová A. and Hrdlička L. (1998): Kámen, sůl a zvětrávání (Stone, salt and weathering). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf (Sandstone phenomenon: climate, life and relief), Knihovna České speleologické společnosti, Praha, Vol. 32, pp. 154–159.
- Clymo R. S. and Duckett J. G. (1986): Regeneration of *Sphagnum*. New Phytol. 102: 589–614.
- Colling G. and Krippel Y. (2003): Notes floristiques. Observations faites au Luxembourg (2000–2001). Bull. Soc. Nat. luxemb. 103: 3–23.
- Corradini P. and Clément B. (1999): Growth pattern and modular reiteration of a hardy coloniser *Polytrichum commune*. Plant Ecol. 143: 67–76.
- Costa M., Peris J. B., Figuerola R. and Stübing G. (1985): Los alcornocales valencianos. Documents phytosociologiques 9: 301–318.
- Coubal M. (1990): Compression along faults: example from the Bohemian Cretaceous Basin. Miner. slovaca 22: 139–144.
- Csaplovics E., Naumann K. and Wagenknecht S. (2003): Beiträge zur Extraktion von Felskanten aus Airborne Laser Scanner Daten am Beispiel der Elbsandsteinformationen im Nationalpark Sächsische Schweiz. PFG 7(2): 106–115.
- Csaplovics E. and Wagenknecht S. (1999a): Airborne Laser Scanning zur topographischen Modellierung von Felsgebieten. In: Strobl J., Blaschke T. (eds.), Angewandte Geographische Informationstechnologie 11, Wichmann, Heidelberg (Beitr AGIT-Symp), pp. 108–119.
- Csaplovics E. and Wagenknecht S. (1999b): Airborne laser scanning for high-resolution topographic modelling of wooded and rugged terrain. Proc. 2nd Joint ISPRS Commission Workshop on Dynamic and Multi-Dimensional GIS, DMGIS'99, Beijing, China, pp. 9–11.
- Csaplovics E. and Walz U. (2001): Spatial information systems for National Park Regions (NPIS) in the Central European Space (CES) – GIS-concepts for monitoring and managing National Park Regions. In: Mander, U., Printsmaan, A. and Palang H. (eds.), Development of European Landscapes. Publ Institutis Geographici Universitatis Taruensis 92: 433–437.
- Csiky J. (2004): Flora and vegetation mapping of the Karancs, the Medves region and the Cerová vrchovina (Nógrád-Gömör basalt region). Pécs, 452 pp.
- Cunningham F. (1964): A detail of process on scarp edges of Millstone Grit. East Midland Geographer 3: 322–326.
- Curry J. P. (1998): Factors affecting earthworm abundance in soils. In: Edwards C. A. (ed.), Earthworm ecology. St. Lucie Press, Boca Raton, pp. 37–64.
- Cvijic J. (1893): Das Karstphänomen. Geogr. Abh., Sien 5: 217–330.
- Cymerman Z. (1992): Objaśnienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów, arkusz Duszniki Zdrój 1 : 25 000 (Explanations to detailed geological map of the Sudetes, sheet Duszniki Zdrój). PIG, Warszawa (in Polish).
- Czech Hydrometeorological Institute (2000): Air Pollution in the Czech Republic, Air Quality Information System, Published report.
- Czeppe Z. (1952): Z morfologii Górz Stołowych (The relief of the Góry Stołowe Mountains). Ochrona Przyrody 20: 236–253 (in Polish).
- Daniells T. J. H. (1981): Southern Sandstone. Climbers' Club Guide.
- D'Arrigo R. D., Schuster W. S. F., Lawrence D. M., Cook E. R., Wiljanen M. and Thetford R. D. (2001): Climate-growth relationships of eastern hemlock and chestnut oak from Black Rock Forest in the hihghlands of southeastern New York. Tree-Ring Research 57(2): 183–190.

SANDSTONE LANDSCAPES

- Davis M. A., Grime J. P. and Thompson K. (2000): Fluctuating resources in plant communities: a general theory of invasibility. *Journal of Ecology* 88: 528–534.
- Davitashvili L. and Zakharieva-Kovacheva K. (1975): *Proizchozdenie kamennich lesov* (Origin of Stone forests). Tbilisi, Metsnierba, 195 pp. (in Russian).
- de Kovel C. G. F., van Mierlo A. (J.)E. M., Wilms Y. J. O. and Berendse F. (2000): Carbon and nutrient in soil and vegetation at sites differing in successional age. *Plant Ecol.* 149: 43–50.
- Debreczy Zs. and Hargitai L. (1971): Die zönologischen und bodenkundlichen Verhältnisse der xerothermen Eichenwälder des Permer-Rotsteines im Balatonoberland. *Annales Hist.-nat. Mus. Nat. Hung.* 63: 117–152.
- Dennis R. W. G. (1978): British Ascomycetes. J. Cramer Vaduz, 585 pp.
- Desplanque C., Rolland C. and Schweingruber F. H. (1999): Influence of species and abiotic factors on extreme tree ring modulation: *Picea abies* and *Abies alba* in Tarentaise and Maurienne (French Alps). *Trees* 13: 218–227.
- di Castri F., Hansen A. J. and Debussche M. (eds.) (1990): Biological invasions in Europe and the Mediterranean basin. Kluwer Academic, Dordrecht, The Netherlands.
- Dieckmann L. (1980): Beiträge zur Insektenfauna der DDR: Coleoptera – Curculionidae (Brachycerinae, Otiorhynchinae, Brachyderinae). *Beitr. Ent.* 30/1, Berlin: 145–310.
- Diederich P. (1991): Les forêts luxembourgeoises à longue continuité historique. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 92: 31–59.
- Diederich P. and Schwenninger J. -L. (1990): Les peuplements relictuels de *Pinus sylvestris* L. au Luxembourg. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 90: 143–152.
- Diederich P. and Sérusiaux E. (2000): The lichens and lichenicolous fungi of Belgium and Luxembourg. An annotated checklist. Musée National d'Histoire Naturelle, Luxembourg, 207 pp.
- Dikau R. and Schrott L. (1999): The temporal stability and activity of landslides in Europe with respect to climate change (TESLEC): main objectives and results. *Geomorphology*, Vol. 30, 1–2, pp. 1–12.
- Dimitriadis G. (2004): Rock Art Geological Distribution in Camonica Valley – Italy. A Preliminary Study. In: Chatzipetros A. A. and Pavlides S. B. (eds.), 5th ISEMG Congress, Thessaloniki, Vol. 2, pp. 743–746.
- Dines H. G., Buchan S., Holmes S. C. A. and Bristow C. R. (1969): Geology of the country around Sevenoaks and Tonbridge. Memoirs of the Geological Survey, HMSO, London.
- Doelling H. (1985): Geology of Arches National Park. Utah Geological and Mineral Survey, Publication 74. Salt Lake City.
- Dohnal Z. (1954): Jatrovky Adršpaško-Teplických skal. (Liverworts of the Adršpaško-teplické skály Cliffs). *Preslia*, Praha 26: 195–198 (in Czech).
- Dohnal Z. (1961): Rašelinště a slatinště Polomených hor (Peat bogs and marshes of Polomené hory Mountains). *Antropozoikum*, Praha 9: 241–276 (in Czech).
- Doktorov L. and Jevterova J. (eds.) (1981): Bulgaria, Protected Natural Sites. A map. Institute of Cartography, Sofia.
- Don J., Jerzykiewicz T., Teisseyre A. K. and Wojciechowska I. (1981): Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów 1 : 25 000. Arkusz Lubawka (Explanatory notes to the Detailed Geological Map of the Sudetes 1 : 25 000. Sheet Lubawka). Wyd. Geol., Warszawa (in Polish).
- Donque G. (1972): The climatology of Madagascar. In: Battistini R. and Richard-Vindard G. (eds.), Biogeography and Ecology in Madagascar. Dr. W. Junk B. V. Publishers, The Hague, pp. 87–144.
- Drake J. A., Mooney H. A., di Castri F., Groves R. H., Kruger F. J., Rejmánek M. and Williamson M. (eds.) (1989): Biological invasions: a global perspective. John Wiley, Chichester, UK.
- Du Puy D. J. and Moat J. (1996): A refined classification of the primary vegetation of Madagascar based on the underlying geology: using GIS to map its distribution and to assess its conservation status. In: W. R. Lourenço (ed.), Biogéographie de Madagascar, Editions de l'ORSTOM, Paris, pp. 205–218.
- Du Puy D. J. and Moat J. (1998): Vegetation mapping and classification in Madagascar (using GIS): Implication and recommendations for the conservation of Biodiversity. In: Huxley C. R., Lock J. M., and Cutler D. F. (eds.), Chorology, Taxonomy and Ecology of the African and Madagascar flora, Royal Botanic Garden, Kew.
- Duff P. McL. D. (ed.) (1995): Holmes' Principles of physical geology. Ed. 4, Chapman and Hall, London-Glasgow, 807 pp.
- Duffey E. (1966): Spider ecology and habitat structure (Arach., Araneae). *Senckenbergiana Biol.* 47: 45–49.
- Duffey E. (1993): A review of factors influencing the distribution of spiders with special reference to Britain. *Memoirs of the Queensland Museum* 33(2): 497–502.
- Dumanowski B. (1961): Zagadnienie rozwoju stoku na przykładzie Górz Stołowych (Slope development on the example of the Góry Stołowe Mountains). *Czasopismo Geograficzne* 32: 311–324 (in Polish).
- During H. J. (1990): Clonal growth patterns among bryophytes. In: van Groenendaal J. and de Kroon H. (eds.), Clonal growth in plants: regulation and function. SPB Academic Publishing, Hague, pp. 153–176.
- Easton E. G. (1983): A guide to the valid names of Lumbricidae (Oligochaeta). In: Satchell J. E. (ed.), Earthworm ecology from Darwin to vermiculture. Chapman and Hall, London, p. 475–485.
- Eckstein R. L. and Karlsson P. S. (1999): Recycling of nitrogen among segments of *Hylocomium splendens* as compared with *Polytrichum commune*: implications for clonal integration in an ectohydric bryophyte. *Oikos* 86: 87–96.
- Edwards C. A. (1998): Earthworm ecology. St. Lusie Press, Boca Raton.

REFERENCES

- Egunjobi J. K. and Bada S. O. (1979): Biomass and nutrient distribution in stands of *Pinus caribaea* L. in the dry forest zone of Nigeria. *Biotropica* 11: 130–135.
- Egunjobi J. K. and Onweluzo B. S. (1979): Litter fall, mineral turnover and litter accumulation in *Pinus caribaea* L. stands at Ibadan, Nigeria. *Biotropica* 11: 251–255.
- Einsele G. (1992): Sedimentary basins. Evolution, facies, and sediment budget. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, London, Paris, Tokyo, Hong Kong, Barcelona, Budapest.
- Eisenschmid R. (ed.) (2002): Deutschland. Jubiläumsausgabe zum 175. Jahrestag der Gründung des Verlags Karl Baedeker. Ostfildern, Ed. 6, 1098 pp. + 65 pp., Atlasteil.
- Ellenberg H. (1988): Vegetation ecology of Central Europe. Cambridge University Press, Cambridge.
- Ellenberg H. (1996): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen in ökologischer, dynamischer und historischer Sicht. Ed. 5, Ulmer, Stuttgart.
- Ellenberg H., Weber H. E., Düll R., Wirth V., Werner W. and Paulissen D. (1992): Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobot. 18, Ed. 2, Göttingen.
- Ellis M. B. (1971): Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute, Kew, 608 pp.
- Ellis M. B. (1976): More Dematiaceous Hyphomycetes. Commonwealth Mycological Institute, Kew, 507 pp.
- Elton C. S. (1958): The ecology of invasions by animals and plants. Methuen, London.
- Engelmark O., Sjöberg K., Andersson B., Rosvall O., Agren G. I., Baker W. L., Barklund P., Björkman C., Despain D. G., Elfving B., Ennos R. A., Karlman M., Knecht M. F., Knight D. H., Ledgard N. J., Lindelow A., Nilsson C., Peterken G. F., Sorlin S. and Sykes M. T. (2001): Ecological effects and management aspects of an exotic tree species: The case of lodgepole pine in Sweden. *Forest Ecology and Management* 141: 3–13.
- Ewald J. (2003): The calcareous riddle: Why are there so many calciphilous species in the central European flora? *Folia Geobotanica* 38: 357–366.
- FAO-WRB (1998): World Reference Base for Soil Resources. World Soil Resources Reports, Vol. 84, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome: pp. 1–88.
- Farr D. F., Bills G. F., Chamuris G. P. and Rossman A. Y. (1989): Fungi on land plants and plant products in the United States. St. Paul.
- Fichter L. S. and Poché D. J. (1993): Ancient environments and the interpretation of geological history. Macmillan Publ. Co., New York.
- Filip J. (1947): Dějinné počátky Českého ráje (The historic beginnings of the Bohemian Paradise). Praha (in Czech).
- Firbas F. (1952): Spät- und nacheiszeitliche Waldgeschichte Mitteleuropas nördlich der Alpen. Vol. 2. Jena.
- Fitzpatrick E. A. (1983): Soils – their formation, classification and distribution. Longman, London, New York, 591 pp.
- Flemming G. (1985): Das Klima des Elbsandsteingebirges. Besonderheiten und Untersuchungsmethoden. *Geographische Berichte*, Leipzig 117/4: 253–262.
- Förster H. (1968): Zur Verbreitung einiger für die Sächsische Schweiz bemerkenswerter Pflanzenarten. *Ber. Arbeitskreis. Sächs. Schweiz*, Dresden 3: 33–47.
- Fos S. (2001): El corcho, guardián natural de los vinos: ecología, economía, cultura y tradición. *Métode (anuario)*: pp. 66–72.
- Franz H. (1970, 1974): Die Nordost-Alpen im Spiegel ihrer Landtierwelt. Vol. 3, 4. Universitätsverlag Wagner, Innsbruck-München.
- Franz L. (1933): Mittelsteinzeitliche Funde bei Drum. *Mitteilungen des Nordböhmischen Vereins für Heimatforschung und Wanderpflege* 56: 33–35.
- Franz L. (1935): Beiträge zur Vor- und Frühgeschichte Böhmens. *Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische Republik*. Prag.
- Frattini S. (1988): I fiori del Adamello (Flowers of Adamello). Vannini, Brescia (in Italian).
- Frattini S. (1997): Torbiere ed altre zone umide nel Parco dell'Adamello e nelle Orobie Bresciane (Peat-moss and humid areas in the Adamello Park and Orobie of Brescia). Regione Lombardia, Milan (in Italian).
- Frego K. A. (1996): Regeneration of four boreal bryophytes: colonization of experimental gaps by naturally occurring propagules. *Can. J. Bot.* 74: 1937–1942.
- Frieser R. (1981): Otiorhynchinae. In: Freude H., Harde K. W. and Lohse G. A., *Die Käfer Mitteleuropas*, Vol. 10, Goecke and Evers, Krefeld: 184–240.
- Fritts H. C. (1994): Precon 4.0. Upgrade. Dendrochronological Modeling, Harold C. Fritts, 5703 North Lady Lane, Tucson, USA.
- Füllner G., Pfeiffer M. and Zarske A. (1996): Die Fischfauna von Sachsen. Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft Dresden/Königswartha und Staatliches Museum für Tierkunde Dresden, 165 pp.
- Gabriel F. and Panáček J. (2000): Hrady okresu Česká Lípa (Castles in the District of Česká Lípa). Argo, Praha (in Czech).
- Gallois R. W. (1965): The Wealden District. British Regional Geology, H. M. S. O., London.
- Gallois R. W. and Worssam B. C. (1993): Geology of the country around Horsham. Memoirs of the British Geological Survey, HMSO, London.
- Geiger R. (1957): The climate near the ground. Harvard University Press, Cambridge.
- Geng X., Pastor J., and Dewey B. (1993): Decay and nitrogen dynamics of litter from disjunct, congeneric tree species in old-growth stands in northeastern China and Wisconsin. *Canadian Journal of Botany* 71: 693–699.
- Génot J.-C. (1995): Vosges du Nord grande nature. Coprur, 72 pp.

SANDSTONE LANDSCAPES

- George U. (1989): Venezuela's islands in time. *National Geographic Magazine* 175: 526–561.
- Glyn P. J. and Prendergast H. D. V. (1995): Ashdown Forest – an illustrated guide. Essendon, Ashurst Wood.
- Goldschmidt J. (1950): Das Klima von Sachsen. Abhandlungen des Meteorologischen Dienstes der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 3: 1–55.
- González J. M., Oria de Rueda J. A. and Pérez de Vicente R. (2001): Inventario abierto de los bosques singulares del sector SE de la provincia de Teruel. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Serie Investigación, 25, Zaragoza.
- Gorbachev B. N. (1974): *Rastitel'nost' i estestvennie kormovie ugodia Rostovskoy oblasti* (The vegetation and natural grasslands of Rostov region). Rostov na Donu, 149 pp.
- Goudie A. (2000): *The Human Impact in the Natural Environment*. MAMIT Press, Cambridge.
- Goudie A. and Viles H. (1997): Salt weathering hazards. John Wiley and Sons, Chichester.
- Gourbière F. and Debouzie D. (2003): Local variations in microfungal populations on *Pinus sylvestris* needles. *Mycol. Res.* 107: 1221–1230.
- Gourbière F., Maanen van A. and Debouzie D. (2001): Association between three fungi on pine needles and their variation along a climatic gradient. *Mycol. Res.* 105: 1101–1109.
- Gressly A. (1838): *Observations géologiques sur le Jura Soleurois. Neue Denkschriften der Allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften* 2: 1–112.
- Grissino-Mayer H., Holmes R. and Fritts H. C. (1992): International tree-ring data bank program library. Version 1. 1. Laboratory of Tree-Ring Research, University of Arizona, Tucson.
- Grünwald C. F. (1827): *Wanderungen auf der Herrschaft Tetschen. Ein Taschenbuch für Freunde schöner Natur*. Prag.
- Guay R. (1995): *WinDENDRO™ v. 6.0. User's Guide*. University du Québec, Québec.
- Gutiérrez M. and Peña J. L. (1990): Las formas de relieve de la provincia de Teruel. Cartillas Turolenses (extra) 7. Teruel.
- Gutzerová N. (1988): Sukcese mechiorostů na dnech skalních pískovcových měst (Succession of bryophytes at sandstone valley bottoms). M.Sc. thesis, Charles University Praha (in Czech).
- Gutzerová N. and Herben T. (1998): Mikroklima a vegetace pískovcových skalních měst (Microclimate and vegetation of sandstone castellated rocks). In: Čílek V. and Kopecký J. (eds.), *Pískovcový fenomén: klima, život a reliéf*, Knihovna České speleologické společnosti, Praha & Broumov, Vol. 32, pp. 25–52 (in Czech).
- Gutzerová N. and Herben T. (2001): Patch dynamics and local succession in a sandstone area with frequent disturbance. *J. Veg. Sci.* 12: 535–544.
- Gutzerová N., Hájek A., Kopecký J., Kuna P., Piňos J., Rohulán J., Spíšek J., Štamberg S., Tůma J. et al. (2002): Chráněná krajinná oblast Broumovsko (Broumovsko Protected Landscape Area). In: Faltysová H., Mackovčín P. and Sedláček M. (eds.), Královéhradecko, Chráněná území ČR (Královéhradecko region, Protected areas of the Czech Republic), Vol. 5, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, pp. 233–272 (in Czech).
- Haas J. (ed.) (2001): *Geology of Hungary*. Eötvös University Press, Budapest.
- Hadincová V., Dobrý J., Hanzelyová D., Härtel H., Herben T., Krahulec F., Kyncl J., Moravcová L., Šmilauer P. and Šmilauerová M. (1997): Invazní druh *Pinus strobus* v Labských pískovcích (The invasive species *Pinus strobus* in Elbe Sandstones). *Zprávy Čes. Bot. Společ.*, Praha 52, Mater. 14:63–79 (in Czech).
- Haffner P. and Wachter H. (1994): Die Unterarten und Hybriden des Brauen Streifenfarns *Asplenium trichomanes* im Nordwestsaarland und in angrenzenden Gebieten. *Delattinia* 21: 59–106.
- Hámor G. (1985): Geology of the Nógrád-Cserhát area. *Geologica Hungarica, Series Geologica* 22: 3–307.
- Hänggi A., Stöckli E. and Nentwig W. (1995): Lebensräume mitteleuropäischer Spinnen. Habitats of Central European spiders. *Miscellanea Faunistica Helvetiae* 4, Centre suisse de cartographie de la faune, Neuchâtel, 459 pp.
- Hans F. (1998): Die Moosflora der Kleinen Luxemburger Schweiz (Müllertal) – Eine systematische Rasterkartierung als Basis für den Moosenschutz. *Travaux Scientifiques du Musée d'Histoire Naturelle*, Luxemburg 28: 1–178.
- Hantschel F. (1894, 1907): *Nordböhmischer Touristenführer. Böhmisches Leipa*.
- Harbusch C., Engel E. and Pir J. B. (2002): Die Fledermäuse Luxemburgs (Mammalia: Chiroptera). *Ferrantia* 33: 1–150.
- Härtel H. (1999): Lesní vegetace navrhovaného Národního parku České Švýcarsko (Forest vegetation of the proposed National Park České Švýcarsko). Ph. D. thesis, Charles University, Pratut (in Czech).
- Härtel H. (2002): Flora and vegetation of the Elbe Sandstones: a comparison with other sandstone regions of the Bohemian Cretaceous basin. In: Kopřivová L. (ed.), Abstract book, International Conference Sandstone landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, p. 7.
- Härtel H. (2005): Beziehungen und Unterschiede in der Flora der Sandsteingebiete des Böhmisches Kreidebeckens. *Ber. Naturforsch. Ges. Oberlausitz*, Görlitz, 13: 49–54.
- Härtel H. and Hadincová V. (1998): Invasion of white pine (*Pinus strobus* L.) into the vegetation of the Elbsandsteingebirge (Czech Republic/Germany). In: Syngre H. and Akeroyd J. (eds.): *Planta Europa Proceedings*. Uppsala and London, pp. 251–255.
- Härtel H. and Marková I. (2005): Phytogeographic importance of sandstone landscapes. In: Ries C. and Krippel Y. (eds.), *Sandstone*

REFERENCES


- Landscapes in Europe – Past, Present and Future, Proceedings of the 2nd International Conference on Sandstone Landscapes, Ferrantia 44: 97–99.
- Hayes A. J. (1965a): Studies on the decomposition of coniferous leaf litter. II. Changes in external features and succession of microfungi. *J. Soil Sci.* 16: 242–257.
- Hayes A. J. (1965b): Some microfungi from Scots pine litter. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 48: 179–185.
- Hazdrová M., Daňková H., Kněžek M., Kulhánek V., Štefek J. and Trefná E. (1983): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000 (Comments on the Basic Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 200 000), list 12 Praha, 163 pp. (in Czech).
- Hazdrová M., Jetel J., Daňková H., Kněžek M., Kulhánek V. and Trefná E. (1980): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000 (Comments on the Basic Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 200 000), list 02 Ústí nad Labem, 120 pp. (in Czech).
- Hejný S. and Slavík B. (1988): Květina České socialistické republiky 1 (Flora of the Czech Socialist Republic 1). Academia, Praha (in Czech).
- Hentschel W. and Stein J. (1996): Experience from the Bohemian-Saxonian Switzerland and Resulting Suggestions for Transboundary Cooperation in Europe. In: Čeřovský J. (ed.), Biodiversity Conservation in Transboundary Protected Areas in Europe, Ecopoint, Praha, pp. 39–47.
- Herben T. (1987): Dynamika invaze *Orthodontium lineare* v Čechách (Dynamics of invasion of *Orthodontium lineare* in Bohemia). Ph. D. thesis, Prague (in Czech).
- Herčík F., Herrmann Z. and Valečka J. (1999): Hydrogeologie České křídové pánve. Český geol. úst. Praha, 115 pp. (in Czech).
- Hettner J. (1887): Gebirgsbau und Oberflächengestaltung der Sächsischen Schweiz. Forschungen zur deutschen Landeskunde, X. Stuttgart.
- Hewitt G. M. (1999): Post-glacial re-colonization of European biota. *Biol. J. Linn. Soc.*, 68: 87–112.
- Hoch K.-L. (1995): Caspar David Friedrich in der Sächsischen Schweiz. Verlag der Kunst, Dresden & Basel.
- Hodgetts N. (1977): A national and international context for the cryptogams in the Weald with reference to current and future conservation initiatives for UK cryptogams. In: Jackson A. and Flanagan M. (eds.), Conservation of cryptogams in the Weald, Proceedings of the Cryptogam Workshop, Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 1–18.
- Hoek E. and Bray J. (1977): Rock Slope Engineering. Ed. 2, Institution of Mining and Metallurgy, London.
- Honců M. (1998): Biologická a krajinná hodnota území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko (Biological and landscapes value of the former Ralsko military area). *Geografie* 3: 171–224 (in Czech).
- Honců M. (1999): Zvířena CHKO Kokořínsko a Holanských rybníků (Fauna of the Kokořínsko Protected Landscape Area and Holanské rybníky ponds). Bezděz, Česká Lípa 8: 209–226 (in Czech).
- Honců M. (2004): Příspěvek k zoologickému hodnocení řeky Ploučnice na okrese Česká Lípa (Contribution to the zoological assessment of the Ploučnice River in Česká Lípa District). Bezděz, Česká Lípa 13: 197–231 (in Czech).
- Honců M. and Volf O. (2002): Českolipsko – Doksy pískovce a mokřady (Českolipsko – Doksy Sandstones and Wetlands). In: Hora J., Marhoul P. and Urban T. (2002): Natura 2000 v České republice, návrh ptačích oblastí (Natura 2000 in the Czech Republic, Proposal for SPAs), pp. (7) 1–4. ČSO Praha (in Czech).
- Honl I. (1973): Toponymie Adršpašských a Teplických skal (Toponomastic of the Adršpach-Teplice Cliffs). *Zpravodaj místopisné komise*, Praha 14: 618–626 (in Czech).
- Horáček I. (1986): Fossil records and chorological status of dormice in Czechoslovakia. Part I: *Glis glis*, *Eliomys quercinus*. *Folia Mus. Rer. Nat. Bohem. occid. Zool.* 24: 49–59.
- Horáček I. (2000): Glacial Cycles and Mammalian Biodiversity of Central Europe: Large Scale Migrations or Vicariance Dynamics? *Geolines*, Praha 11: 103–107.
- Horáček I. and Ložek V. (1988): Palaeozoology and the Mid-European Quaternary past: scope of the approach and selected results. *Rozpravy ČSAV, ř. MPV*, 98: 1–106.
- Horscroft J. (1996): A view from the Sand-pit. Climber, May issue, 14–20.
- Horvát A. O. (1972): Die Vegetation des Mecsekgebirges und seiner Umgebung. Akadémiai Kiadó, Budapest, 376 pp.
- Hostomský J., Hostomská V., Bezdička P. and Selucká J. (1998): Phase equilibria during the crystallisation of ammonium alum from acid solutions with a variable ratio NH₄/Al. Unpublished report, Institute of chemical technology in Prague (in Czech).
- Hradil D. and Hostomský J. (2002): Effect of composition and physical properties on the strong acid weathering rates of natural kaolinites. *Catena* 49: 171–181.
- Hradil D., Hostomský J. and Soukupová J. (2002): Aluminium Release Rates from Acidified Clay Structures: Comparative Kinetic Study. *Geologica Carpathica* 53(2): 117–121.
- Hrouda L., Mandák B. and Hadinec J. (eds.) (1996): Materiály k flóře Kokořínska a Mělnicka (Material to flora of Kokořínsko and Mělnicko regions). *Příroda* 7: 7–109 (in Czech).
- Hunckler R. V. and Schaetzl R. J. (1997): Spodosol development as affected by geomorphic aspect, Baraga County, Michigan. *Soil Sci. Soc. Am. J.* 61: 1105–1115.
- Hunger W. (1963): Standörtliche und regionale Gliederung des Elbsandsteingebirges. Sächsische Schweiz, Berichte des Arbeitkreises Sächsische Schweiz in der Geographischen Gesellschaft der DDR, Pirna 1: 25–86.

SANDSTONE LANDSCAPES

- Huston M. (1979): A general hypothesis of species diversity. *American Naturalist* 113: 81–101.
- Hynie O. (1949): Vodárensky využitelné vydatné nádrže podzemních vod v Čechách (Economically viable groundwater resources in Bohemia). *Geotechnika*, Praha 8: 1–115 (in Czech).
- Hynie O. (1961): Hydrogeologie ČSSR I. Prosté vody (Hydrogeology of Czechoslovakia I. Fresh waters). Nakl. Čs. Akad. Věd., Praha, 562 pp. (in Czech).
- Ibáñez M. J. (1976): El piedemonte ibérico bajoaragonés. Estudio geomorfológico. CSIC.
- Iliev Z., Nikolov G. and Kourtev K. (1998): "Pobitite kamani" ("Dikili-tash", the upright Stone columns), a unique natural and geological phenomenon. *Geologica Balcanica* 28 (3–4): 87–90.
- IUCN (1998): 1997 United Nations List of Protected Areas. IUCN, Gland and WCMC, Cambridge, 412 pp.
- IUCN (2003): Recommendations. Vth IUCN World Parks Congress, Durban, 85 pp.
- Ivanov R. and Kopp K.-O. (1969): Das Alttertiär Thrakiens und der Ostrhodope. *Geol. et Palaeontol.* 3: 123–151.
- Jackson A. and Flanagan M. (eds.) (1997): Conservation of cryptogams in the Weald. Proceedings of the Cryptogam Workshop, Royal Botanic Gardens, Kew.
- Jankovská V. (1992): Vegetationsverhältnisse und der Naturumwelt des Beckens Jestřebská kotlina am Ende des Spätglazials und im Holozän (Doksy-Gebiet) (The development of vegetation and environment in the Jestřebská Kotlina basin at the end of the late-Glacial and during the Holocene periods (Doksy area). *Folia Geobot. Phytotax.* 27: 137–148.
- Jankovská V. (2000): Komořanské jezero Lake (CZ, NW Bohemia) – A Unique Natural Archive. *Geolines* 11: 115–117.
- Jędryszczak E. and Masiczki S. (2001): Lasy Parku Narodowego Góra Stołowych (Forests of the Góra Stołowe National Park). *Szczeliniec* 5: 79–103 (in Polish).
- Jeffries R. L. (2000): Allochthonous inputs: integrating population dynamics and food-web changes. *Trends Ecol. Evol.* 15: 19–22.
- Jenč P. (2006): Soupis speleoarcheologických lokalit Českého ráje – terénní průzkum a evidence nálezů v letech 1992–2003 (A list of speleoarchaeological sites of the Bohemian Paradise – field surveys and registration of finds made in the years 1992–2003). In: Jenč P. and Šoltysová L. (eds.), *Pískovcový fenomén Českého ráje (Sandstone Phenomenon of the Bohemian Paradise)*, Turnov, pp. 117–156 (in Czech).
- Jenč P., Pátková H. and Peša V. (eds.) (2001): Historické skalní rytiny v Labských pískovcích, 1. etapa dokumentace v okolí Jetřichovic (Historical rock engravings in the Elbe Sandstones, 1st stage of the research near Jetřichovice village). *Porta Bohemica*, Litoměřice 1: 149–166 (in Czech).
- Jenč P. and Peša V. (2000): Nejstarší osídlení severních Čech (The oldest settlement of northern Bohemia). *Česká Lípa* (in Czech).
- Jeník J. (1961): Alpinská vegetace Krkonoš, Králického Sněžníku a Hrubého Jeseníku. (Alpine vegetation of the Krkonoše, Králický Sněžník and Hrubý Jeseník Mts.). Praha (in Czech).
- Jeník J. and Rejmánek M. (1969): Interpretation of direct solar irradiation in ecology. *Arch. Met. Geograph. Biokl. Ser. B, Wien*, 17: 413–428.
- Jenka O. and Kopecký J. (2004): Výzkum a dokumentace pseudokrasu Broumovské vrchoviny – stav k roku 2003 (The state of research and documentation of pseudokarst phenomena in the Broumovská vrchovina Upland as of 2003). In: Gál L. (ed.), *Proc. 8th Int. Symp. on Pseudokarst, Teplý Vrch – Slovakia, Slovak Caves Administration, Liptovský Mikuláš* (in Czech), pp. 84–91.
- Jennings J. N. (1983): Sandstone karst or pseudo-karst? In: Young, R. W. and Nanson, G. N. (eds.), *Aspects of Australian sandstone landscapes*. Australian NZ Geomorphological group Wollongong, Australia, pp. 21–30.
- Jerzykiewicz T. (1967): Significance of the cross-bedding for the paleogeography of the Upper Cretaceous sedimentary basin of the North Bohemia, Saxony and Sudetes. *Bull. Acad. Pol. Sci.* 15: 71–77.
- Jerzykiewicz T. (1968a): Sedimentacja górnych piaskowców ciosowych Niecki Śródsudeckiej (górná kreda) (Sedimentation of the Upper Cretaceous joint sandstones in the Intra-Sudetic Basin). *Geologia Sudetica* 4: 465–476 (in Polish).
- Jerzykiewicz T. (1968b): Uwagi o orientacji i genezie ciosu w skałach górnokredowych Niecki Śródsudeckiej (Orientation and genesis of the joint network in the Upper Cretaceous rocks of the Intra-Sudetic Basin). *Geologia Sudetica* 4: 465–476 (in Polish).
- Jerzykiewicz T. (1971): Kreda okolic Krzeszowa (Cretaceous in the vicinity of Krzeszów) *Geol. Sudetica* 5: 281–327 (in Polish).
- Jerzykiewicz T. and Szymowski A. (1970): Zależność między budową geologiczną i spadkami rzeczywistymi terenu w okolicach Krzeszowa (The dependence of the dips of slopes upon the geological structure in the relief of the vicinity of Krzeszów, Sudetes). *Acta Geol. Polonica* 20: 235–245 (in Polish).
- Jerzykiewicz T. and Wojewoda J. (1986): The Radków and Szczeliniec Sandstone (An example of the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe). *Shelf Sands and Sandstones*. Can. Soc. Petr. Geol., Mem. 11 (in Polish).
- Jeschke L. (2001): Urwälder von morgen. In: Succow M., Jeschke L. and Knapp H.-D., *Die Krise als Chance, Naturschutz in neuer Dimension*, Michael Succow Stiftung zum Schutz der Natur, Findling, Neuenhagen, Germany, pp. 152–166.
- Jestaz Y. and Robin R. P. (1998): Fontainebleau Château, Ville, Forêt (The Castle, The Town, The Forest). La Lézarde, 176 pp.
- Jetel J. (1974): Hydrogeologie podloží české křídové pánve (Hydrogeology of the bedrock of the Bohemian Cretaceous Basin). In: M. Malkovský et al., *Geologie české křídové pánve a jejího podloží* (Geology of the Bohemian Cretaceous Basin and its bedrock), ÚUG Praha, pp. 156–190 (in Czech)

REFERENCES

- Jetel J., Krásný J., Daňková H., Kněžek M., Kulhánek V., Rybářová L. and Trefná E. (1986): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000 (Comments on the Basic Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 200 000), list 03 Liberec, list 04 Náchod (part). 157 pp. (in Czech).
- Johnson H. D. and Baldwin C. T. (1986): Shallow siliciclastic seas. In: Reading, H. G. (ed.), Sedimentary environments and facies, p. 229–282. 2nd Ed., Blackwell Sci. Publ. Oxford.
- Johnstone I. M. (1986): Plant invasion windows – a time-based classification of invasion potential. Biological Reviews of the Cambridge Philosophical Society 61: 369–394.
- Kabała C., Szerszeń L. and Wicik B. (2002): Geneza, właściwości i systematyka gleb Parku Narodowego Góra Stołowa. (Origin, Properties and Classification of Soil in the Stołowe Mountains National Park). Szczeliniec 6: 21–94 (in Polish).
- Kačura G., Daňková H., Holánek I., Kněžek M., Kulhánek V. and Trefná E. (1991): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě ČSSR 1 : 200 000 (Comments on the Basic Hydrogeological map of Czechoslovakia 1 : 200 000), list 14 Šumperk, list 04 Náchod (part). 145 pp. (in Czech). Překlad titulu. Místo vydání.
- Kalousk J. (1910): Archiv český (Czech Archive). XXV, Praha (in Czech).
- Kalvoda J. and Zvelebil J. (1983): Dynamika a typy porušování svahů při vývoji údolí Labe v Děčínské vrchovině (Dynamics and typology of slope destruction processes during development of the Elbe River valley in Děčín Highlands). Acta Montana, Praha, 63: 5–73 (in Czech).
- Kaňák K. (1999): Záhadné chování vejmutovky v Labských pískovcích (Strange behaviour of White Pine in the Elbe Sandstones). Lesnická práce 78 (8): 348–350 (in Czech).
- Karczewska A., Bartoszewska K. and Szerszeń L. (1998): Želazo w wybranych profilach gleb wytworzonych z piaskowców na terenie PNGS (Iron in selected profiles of acid brown and Podzol soils developed from sandstone in the area of the SMNP). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 464: 201–210 (in Polish).
- Kaše J. and Kotlík P. (1999): Braunův Betlém (Braun's Bethlehem). Praha (in Czech).
- Kazakova M. V. and Sobolev N. A. (eds.) (2004): Prirodno-zapovednyj fond Ryazanskoy oblasti (Protected natural fund of the Ryazan Region). Russkoye slovo, Ryazan, 420 pp. (in Russian).
- Kempson D., Lloyd M. and Gheraldi R. (1965): A new extractor for woodland litter. Pedobiologia 3: 1–21
- Kendrick W. B. and Burges A. (1962): Biological aspect of the decay of *Pinus sylvestris* leaf litter. Nova Hedwigia 4: 313–342.
- Kessler P. (1921): Über Lochverwitterung und ihre Beziehungen zur Methamorphose (Umbildung) der Gesteine. Geologische Rundschau, Leipzig 12: 237–270.
- Kicińska B., Olszewski K. and Źmudzka E. (1999): Generalne cechy klimatu (The general features of climate). In: Zgorzelecki M. (ed.), Góry Stołowe (The Góry Stołowe Mountains). "Dialog" Press., Warszawa, pp. 89–95 (in Polish).
- Kippenberg H. (1983): Hylobiinae. In: Freude H., Harde K. W. and Lohse G. A., Die Käfer Mitteleuropas, Vol. 11, Goecke and Evers, Krefeld, pp. 121–154.
- Klein V., Domečka K., Eliáš M., Opletal M., Nakládal V. and Shrbený O. (1971): Vysvětlující text k základní geologické mapě 1 : 25 000 (Comments on the Basic Geological Map 1 : 25 000), list M-33-41-B-d Chřibská. ÚÚG. Archiv ČGS, Praha (in Czech).
- Klein V., Opletal M. and Pražák J. (1967): Vysvětlující text k základní geol. mapě 1 : 25 000 (Comments on the Basic Geological Map 1 : 25 000), list M-33-41-A-c Königstein a M-33-41-A-d Hřensko. ÚÚG, Geofond, Praha (in Czech).
- Knight D. H., Baker W. L., Engelmark O. and Nilsson C. (2001): A landscape perspective on the establishment of exotic tree plantations: lodgepole pine (*Pinus contorta*) in Sweden. Forest Ecology and Management 141: 131–142.
- Knížek M. (2003a): K výskytu kůrovů na jehličnanech v Národním parku České Švýcarsko (On the occurrence of bark beetles on coniferous trees in the Bohemian Switzerland National Park). In: Kapitola P. (ed.), Škodliví činitelé v lesích Česka 2002/2003 (Harmful agents in the forests of the Czech Republic 2002/2003). Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady, pp. 57–59 (in Czech).
- Knížek M. (2003b): Podkorní hmyz (Bark boring insects). In: Kapitola P., Knížek M. (eds.), Výskyt lesních škodlivých činitelů v roce 2002 a jejich očekávaný stav v roce 2003 (Occurrence of forest damaging agents in 2002 and forecast for 2003). Zpravodaj ochrany lesa. LOS – Lesní ochranná služba, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Jíloviště – Strnady, pp. 15–24 (in Czech).
- Knížek M. and Zahradník P. (1999): Bark and Wood Boring Beetles in the Pine Stand. In: Forster B., Knížek M. and Grodzki W. (eds.), Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe. Proceedings of the Second Workshop of the IUFRO WP 7.03.10, April 20–23, 1999, Sion-Chateauneuf, Switzerland, WSL Birmensdorf, pp. 54–59.
- Kocurek G. (1991): Interpretation of ancient eolian sand dunes. Ann. Rev. Earth Planet. Sci. 19: 43–75.
- Koechlin J. (1972): Flora and vegetation of Madagascar. In: Battistini R. and Richard-Vindard G. (eds.), Biogeography and Ecology in Madagascar. Dr. W. Junk B. V. Publishers, The Hague, pp. 145–190.
- Koenigswald W. von and Taute W. (1979): Zwei bedeutende Quartärprofile in der Burghöhle von Dietfurt bei Siegmaringen a. d. Donau. N. Jb. Geol. Paläont., Stuttgart, Mh 1979(4): 216–236.
- Köhler F. and Klausnitzer B. (1998): Verzeichnis der Käfer Deutschlands. Ent. Nachr. Ber., Dresden, Beiheft 4: 1–185.
- Kojumdgieva E., Nikolov I., Nedjalkov P. and Buzev A. (1982):



SANDSTONE LANDSCAPES

- Stratigraphy of the Neogene in the Sandanski graben. *Geologica Balcanica* 12/3: 69–81.
- Kolbek J. (2004): Bazifilní a xerické bory severních Čech – předběžný přehled (Basiphilous and xeric pine forests in the northern Bohemia – a preliminary overview). – *Bull. Slov. Bot. Spoločn.*, Bratislava, Suppl. 11:197–204 (in Czech).
- Kopecká V. and Vasilová D. (eds.) (2003a): Seznam zvláště chráněných území ČR (List of special protected areas in the Czech Republic). AOPK ČR, Praha, 535 pp. (in Czech).
- Kopecká V. and Vasilová D. (eds.) (2003b): Chráněná území přírody České republiky (Special Protected Areas of Nature, Czech Republic). A map. SHOCart, Vizovice, Czech Republic (in Czech).
- Kopecký J. (1998): Současný stav měření mikroklimatu v pseudokrasových terénech Broumovské vrchoviny (Present state of microclimate measurements in pseudokarst terrains of the Broumovská vrchovina Highland). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief (Sandstone phenomenon: climate, life and relief), Knihovna České speleologické společnosti, Praha, Vol. 32, pp. 16–24 (in Czech).
- Koperski M., Sauer M., Braun W. and Gradstein S. R. (2000): Referenzliste der Moose Deutschlands. Schriftenreihe für Vegetationskunde 34: 1–519.
- Kopřivová L. (2001): Vliv zasypání pískem na vegetaci v pískovcových oblastech (The effect of burial by sand on vegetation of sandstone regions). M.Sc. thesis, Charles University, Praha (in Czech).
- Kordos L. (1982): Evolution of the Holocene Vertebrate Fauna in the Carpathian Basin. *Z. geol. Wiss.* Berlin, 10: 963–970.
- Kornaś J. (1955): Charakterystyka geobotaniczna Górców (Geobotanical characteristics of the Gorce Mts.). *Mon. Bot.* 3: 1–216 (in Polish).
- Körner C. (1999): Alpine plant life. Functional plant ecology of high mountain ecosystems. Springer, Berlin.
- Kostin S. I. (1951): Osnovy meteorologii i klimatologii (Principles of meteorology and climatology). Ed. 2, GIMIZ, Leningrad (in Russian).
- Kowalkowski A. (1997a): Einige Indikatoren der diagnostischen Horizonte in Rostboeden aus fluvioglazialen Sanden der brandenburger und pommerschen Fazies des Vistulians. *Mitt. DBG* 85: 1191–1194.
- Kowalkowski A. (1997b): Związki genetyczne między seriami pokryw stokowych i budową profilu gleb terenów górskich na przykładzie głównego masywu Łysogór (Genetic relationships between slope cover series and soil profile structure in mountain areas on an example of the main Łysogóry massif). *Zesz. Problem. Post. Nauk Roln.* 464: 37–58 (in Polish).
- Kowalski S. (1980): Charakterystyka hydrogeologiczna źródeł Górz Stołowych (Hydrogeological characteristics of springs in the Górz Stołowe Mountains). *Kwartalnik Geologiczny* 24(4): 885–904 (in Polish).
- Kozdrój W., Krentz O. and Opletal M. (2001): Comments on the Geological Map Lausitz-Jizera-Karkonosze (without Cenozoic sediments) 1 : 100 000. Polish Geological Institute, Warszawa.
- Krásný J. (2001): Carlsbad mineral water origin in context of Post-Variscan development in Central Europe. In: Seiler K.-P. and Wohnlich S. (eds.), New approaches to characterising groundwater flow. Proc. 31 IAH Congress, Sept. 10–14, 2001, Munich. Balkema Rotterdam, pp. 989–993.
- Krásný J. (2003): Important role of deep-seated hard rocks in a global groundwater flow: possible consequences. In: Krásný J., Hrkáč Z. and Bruthans J. (eds.), Proceedings – IAH Internat. Conference on “Groundwater in fractured rocks”, Sept. 15–19, 2003. Prague, IHP-VI, Series on Groundwater 7. UNESCO, pp. 147–148.
- Krásný J., Daňková H., Kněžek M., Krásná R., Kulhánek V., Skořepa J. and Trefná E. (1982): Vysvětlivky k základní hydrogeologické mapě Československa (Explanation to the hydrological map of Czechoslovakia). 1 : 200 000 list Hradec Králové. Ústř. úst. geol., Praha, 159 pp. (in Czech).
- Krásný J., Kněžek M., Šubová A., Daňková H., Matuška M. and Hanzel V. (1981): Mapa odtoku podzemní vody ČSSR 1 : 1 000 000 (The map of ground water runoff, Czechoslovakia, 1 : 100 000). Český hydrometeor. úst. Praha (in Czech).
- Krásný J., Kněžek M., Šubová A., Daňková H., Matuška, M. and Hanzel V. (1982): Odtok podzemní vody na území Československa (The runoff of ground water from the area of Czechoslovakia). Český hydrometeor. úst. Praha, 50 pp. (in Czech).
- Kraus K. and Pfeifer N. (1998): Determination of terrain models in wooded areas with airborne laser scanner data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing* 53(4): 193–203.
- Krause R. (1978): Untersuchungen zur Biotopbindung bei Rüsselkäfern der Sächsischen Schweiz (Coleoptera, Curculionidae). *Entol. Abh. Mus. Tierk.*, Dresden, 42: 1–201.
- Krippel Y. (1995): Biotopkartierung der Gemeinde Berdorf. Fondation Oeko-Fonds & Ministère de l'Environnement, 97 pp. + appendix (unpublished).
- Krippel Y. (2001): Aire de répartition et statut de *Trichomanes speciosum* Willd. (Hymenophyllaceae) au Grand-Duché de Luxembourg. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 102: 3–13.
- Krippel Y. (2003): Aire de répartition et statut d'*Asplenium trichomanes* L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis & Reichstein (Aspleniaceae, Pteridophyta) au Luxembourg. *Bull. Soc. Nat. Luxemb.* 104: 3–12.
- Krippel Y. (ed.) (2005). – Die Kleine Luxemburger Schweiz – Geheimnisvolle Felsenlandschaft im Wandel der Zeit. Luxembourg, 251 pp.
- Krukowski M. and Świerkosz K. (2004): Discovery of the gametophytes of *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) in Poland and its biogeographical importance. *Fern Gaz.* 17(2): 79–85.

REFERENCES

- Kubát K. (1974): Proudění vzduchu sutěmi jako ekologický faktor. *Opera Concoritica, Vrchlabí* 11: 53–67 (in Czech).
- Kubát K. et al. (eds.) (2002): Klíč ke květeně České republiky (Key to the Flora of the Czech Republic). Academia, Praha (in Czech).
- Kubát K., Ondráček Č. and Machová I. (eds.) (1999): Floristický kurs ČBS Česká Lípa 1998 (Floristical course of the Czech Botanical Society in Česká Lípa in 1998). Severočes. Přír., Litoměřice, Suppl. 11.
- Kučera J. and Váňa J. (2003): Check- and Red List of bryophytes of the Czech Republic (2003). Preslia, Praha 75: 193–222.
- Kučera T. and Špryňar P. (1996): Flóra a vegetace Kokořínského dolu (The flora and vegetation of the Kokořínský důl Valley). Příroda, Praha 7: 181–255.
- Kühn P. (2005): „Samuelova jeskyně“, bývalá skalní poustevna u Sloupu (“Samuel Cave” a former rock hermitage near Sloup). Bezděz, Česká Lípa 12: 417–426 (in Czech).
- Kühn P., Havránek P. and Adamovič J. (2001): Geologische Aspekte des Eisenerz-Bergbaus in den Sandsteinen der Lausitzer Kreide. *Geologica Saxonica – Abh. Mus. Miner. Geol. Dresden* 46/47: 125–137.
- Kuncová J. (ed.) (1999): Ústecko. Chráněná území České republiky I (Ústecko region, Protected areas of the Czech Republic I). AOPK ČR, Praha (in Czech).
- Kuneš P. (2001): Vývoj holocenní vegetace a spad pylu v Adršpašsko-teplických skalách (Postglacial vegetation development and pollen deposition in the Adršpašsko-teplické skály Cliffs). M.Sc. thesis, Katedra botaniky PřF UK (in Czech).
- Kuneš P. and Jankovská V. (2000): Outline of Late Glacial and Holocene Vegetation in a Landscape with Strong Geomorphological Gradients. *Geolines* 11: 112–114.
- Kuršs V., Enīņš G., Stinkule A., Straume J. and Venska V. (1989): Geological objects of Gauja National Park. Riga.
- Kuznicki F. (ed.) (1989): Systematyka Gleb Polski (Classification of Polish Soils). Roczn. Glebozn. 40 (3–4): 1–72 (in Polish).
- Laity J. and Malin M. C. (1985): Sapping processes and the development of theater headed valley networks on the Colorado Plateau. *Geol. Soc. Am. Bull.* 96: 203–217.
- LaMarche Jr. V. C. (1974): Frequency-dependent relationships between tree-ring series along an ecological gradient and some dendroclimatic implications. *Tree-Ring Bulletin*, 34: 1–20.
- Larson D. W., Spring S. H., Matthes-Sears U. and Barlett R. M. (1989): Organization of the Niagara Escarpment cliff community. *Can. J. Bot.* 67: 2731–2742.
- Latałowa M. (1989): Type region P-h: Silesia-Cracow Upland. *Acta Palaeobotanica* 29: 45–49.
- Latocha A. (2003): Uwarunkowania rozwoju struktur płytowych na przykładzie Górz Stołowych i Górz Bystrzyckich (Controls on the development of structural plateau relief – on examples of the Góry Bystrzyckie and Stołowe Mountains). *Przegląd Geograficzny* 75(2): 230–249 (in Polish).
- Lee K. E. (1985): Earthworms, their ecology and relationships with soils and land use. Academic Press, Sydney.
- Lentschig-Sommer S. (1960): Petrographische Untersuchung der Wabenverwitterung des Elbsandsteins. *Jahrbuch Staatliches Museum für Mineralogie und Geologie*: 111–126.
- Lentschig-Sommer S. (1961): Ein Vorkommen von Alunogen Keramohalit im Elbsandsteingebiet. *Jahrbuch Staatliches Museum für Mineralogie und Geologie*: 109–110.
- Linton D. L. (1964): The problem of Pennine Tors: an essay in analysis. *Zeitchrift für Geomorphologie*, NF 8: 5–24.
- Liron M. N. and Royaud A. (2001): Réseaux des mares du Massif de Fontainebleau. II – Etude des zones humides tourbeuses de la platière des Couleuvreux. *Rapport Armines/Ecole des Mines de Paris, LHM/RD/01/58*, 101 pp.
- Liška J., Palice Z. and Dětinský R. (1998): Změny v rozšíření vzácných a ohrožených lišejníků v České republice I. (Changes in the distribution of rare and threatened lichens in the Czech Republic I). Příroda, Praha, 12: 131–144 (in Czech).
- Liška J. and Pišút I. (1995): Lišajníky (Lichens). In: Kotlaba F. (ed.), Červená kniha ohrožených a vzácných druhov rastlin a živočichov SR a ČR 4. Sinice a riasy, huby, lišajníky, machorasty (Red Data-book of endangered and rare species of plants and animals of the Slovak and Czech Republics 4. Blue and green algae, fungi, lichens, bryophytes). Príroda, Bratislava, pp. 120–156 (in Slovak).
- Lloret F. (1994): Gap colonization by mosses on a forest floor: an experimental approach. *Lindbergia* 19: 122–128.
- Lobst R. (ed.) (1995): Geologische Karte der Nationalparkregion Sächsische Schweiz 1 : 50000. Sächs. Landesamt f. Umwelt u. Geologie, Freiberg.
- Loksa I. (1966): Die Bodenzönologischen Verhältnisse der Flaumeichen Buschwälder Südostmitteleuropas. Akadémiai Kiadó, Budapest, 437 pp.
- Lompe A. (1976): Trechinae. In: Freude H., Harde K. W. and Lohse G. A., Die Käfer Mitteleuropas, Vol. 2, Goecke & Evers, Krefeld, pp. 75–95.
- Lowry P. P. II, Schatz G. E. and Phillipson P. B. (1997): The classification of natural and anthropogenic vegetation in Madagascar. In: Goodman S. M. and Patterson B. D. (eds.), Natural change and human impact in Madagascar. Smithsonian Institution Press, Washington, D. C., pp. 93–123.
- Lozano M. V. (1997): Notas geomorfológicas sobre la depresión de Sarrión y el valle del río Mijares. *Studium, Revista de Humanidades* 4: 141–161.
- Ložek V. (1964): Quartärmollusken der Tschechoslowakei. *Rozpravy Ústředního ústavu geologického*, Praha 51: 1–374.
- Ložek V. (1982): Faunengeschichtliche Grundlinien zur spät und nacheiszeitlich Entwicklung der Molluskenbestände in Mitteleuropa. *Rozpravy ČSAV, Praha, ř. MPV* 92(4): 1–106.
- Ložek V. (1988): Postglaciální osyp pod skalními sruby Jizery

SANDSTONE LANDSCAPES

- u Ptýrova (A postglacial talus under rock shelters of the Jizera River at Ptýrov). Bohemia Centralis, Praha 17: 119–137 (in Czech).
- Ložek V. (1997): Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech (Malacological records from Sandstone Rock-shelters and the Problem of Late Prehistoric Landscape Degradation in Wider Aspects). Ochrana přírody, Praha 52: 146–148 (in Czech).
- Ložek V. (1998a): Late Bronze Age environmental collapse in the sandstone areas of northern Bohemia. In: B. Hänsel (ed.), Mensch und Umwelt in der Bronzezeit Europas, Kiel, pp. 57–60.
- Ložek V. (1998b): Změny biocenóz Milovické pahorkatiny podle výpovědi měkkýšů (Mollusc-based information on ecosystem changes in the Milovická pahorkatina Upland). Region, Brno-Mikulov: 4–9 (in Czech).
- Ložek V. (2000): CHKO Kokořínsko a záhada Polomených hor (The Kokořínsko region and the puzzle of the Polomené hory Mountains). Ochrana přírody 55: 114–118 (in Czech).
- Lucius M. (1948): Geologie Luxemburgs, Das Gutland. Erläuterungen zu der geologischen Spezialkarte Luxemburgs, Band V. Service Géologique de Luxembourg, 405 pp.
- Lührte A. von (1992): Dendroecological studies on pine and oak in the forests of Berlin (West). In: Bartholin T. S., Burglund B. E., Eckstein D., Schweingruber F. H. and Eggertsson O. (eds.), Tree Rings and Environment: Proceedings of the International Symposium, Ystad, South Sweden, 3.–9. September 1990, Lund University, Department of Quaternary Geology, Lundqua report 34, pp. 212–216.
- Lundstrom U. S., van Breemen N. and Bain D. (2000): The podzolization process. A review. Geoderma 94: 91–107.
- Lyon Ch. J. (1940): Tree growth beside a rain gauge and thermometer. Ecology 21(4): 425–437.
- MacArthur R. H. and Wilson E. O. (1967): The theory of island biogeography. Princeton University Press.
- MacDonald I. A. W., Loope L. L., Usher M. B. and Hamann O. (1989): Wildlife conservation and the invasion of nature reserves by introduced species: a global perspective. In: Drake J. A., Mooney H. A. and di Castri F. et al. (eds.), Biological invasions: a global perspective, John Wiley, Chichester, pp. 215–255.
- Mácová M. (2001): Tree-ring analysis of crown competition and climatic sensitivity in *Pinus strobus* and *P. sylvestris* stands in the Elbe River Sandstone Mountains. Dendrochronologia 19(1): 103–115.
- Mader D. (1992): Evolution of Palaeoecology and Palaeoenvironment of Permian and Triassic Fluvial Basins in Europe. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart & New York.
- Madeyska E. (1989): Type region P-f: Sudetes Mts.-Bystrzyckie Mts. Acta Palaeobotanica 29: 37–41.
- Magnussen S. and Boudewyn P. (1999): Derivation of stand heights from airborne laser scanner data with canopy-based quantile estimators. Canadian Journal For. Res. 28: 1016–1031.
- Mahelka V., Mandák B. and Bímová K. (2002): Synantropní flóra vybraných vesnic v CHKO Kokořínsko (Synanthrophic flora of selected villages in the Kokořínsko Protected Landscape Area). Zprávy Čes. Bot. Společ. 37: 171–183 (in Czech).
- Main I., Mair K., Kwon O., Elphick S. and Ngwenya B. (2001): Experimental constraints on the mechanical and hydraulic properties of deformation bands in porous sandstone: a review. In: Holdsworth R. E. et al. (eds.), The nature and tectonic significance of fault zone weakening, Geol. Soc. London Spec. Publ. 186, pp. 43–63.
- Mainguet M. (1972): Les Modeles des Gres. Intitute Geographie Natl. Paris.
- Malík J. (1998): Ledová jeskyně Naděje – dlouhodobé měření teplot (Ice-cave Naděje – long temperature record). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief, Knihovna České speleologické společnosti, Vol. 32, Praha, pp. 41–48 (in Czech).
- Maršíková M. (1980): Z historie snah o ochranu Českého ráje (From the history of the Bohemian Paradise conservation). Památky a příroda, Praha 5: 552–553 (in Czech).
- Marshall C. (1990): Source-sink relations of interconnected ramets. In: van Groenendael J. and de Kroon H. (eds.), Clonal growth in plants: regulation and function, SPB Academic Publishing, Hague, pp. 23–41.
- Marstaller R. (1990): Bemerkenswerte Moosgesellschaften im sächsischen Elbsandsteingebirge. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 63(7): 1–49.
- Marstaller R. (1995): Die azidophytische Bryophytenvegetation in einigen Gebirgen der Umgebung von Budapest, Ungarn. Feddes Repert., Berlin 106: 247–270.
- Martini A. (1997): The Externsteine. In: Westwood J., Sacred Journeys, Gaia Books Limited, London, pp. 154–155.
- Mateo G. (1990): Catálogo florístico de la provincia de Teruel. Instituto de Estudios Turolenses, Teruel.
- Matsushima T. (1975): Icones Microfungorum A Matsushima Lectorum. Published by the author, Kobe, 209 pp.
- Matuszkiewicz W. (2001): Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski (A guide for identification of the plant communities of Poland). Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 536 pp. (in Polish).
- Maun M. A. (1998): Adaptations of plants to burial in coastal sand dunes. Can. J. Bot. 76: 713–738.
- Maun M. A. and Perumal J. (1999): Zonation of vegetation on lacustrine coastal dunes: effects of burial by sand. Ecol. Lett. 2: 14–18.
- McBride E. F. (1989): Quartz cement in sandstones: A review. Earth Sci. Rev. 26: 69–112.
- McBride E. F. and Picard M. D. (2004): Origin of honeycombs and

REFERENCES

- related weathering forms in Oligocene, Macigno Sandstone, Tuscan coast near Livorno, Italy. *Earth Surface Processes and Landforms* 29: 715–735.
- Melillo J. M., Aber J. D. and Muratore J. F. (1982): Nitrogen and lignin control of hardwood leaf litter dynamics in forest ecosystems. *Ecology* 63: 621–626.
- Mertlík J., Mrkáček Z., Tomsa T., Vacková D. et al. (2002): Chráněná krajinná oblast Český ráj (Bohemian Paradise Protected Landscape Area). In: Mackovčín P., Sedláček M. and Kuncová J. (eds.), Liberecko, Chráněná území ČR (Liberecko region, Protected areas of the Czech Republic), Vol. 3, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha, pp. 195–230 (in Czech).
- Meyer F. D. (1999): Pointer year analysis in dendroecology: A comparison of methods. *Dendrochronologia* 16–17: 193–204.
- Miall A. D. (1996): The geology of fluvial deposits. Springer Verlag, Berlin.
- Migoń P. and Placek A. (2007): Rock control and geomorphology of a rocky sandstone scarp, Middle Sudetes Mountains, SW Poland. *Zeitschrift für Geomorphologie N.F.* 51, suppl. 1: 41–55.
- Mikuláš R. (1999): The protective effect of lichens and the origin of modern bulge-like traces on weakly lithified sandstones (Hilbre Islands, Wirral Peninsula, Great Britain). *Ichnos*, Amsterdam 6(4): 261–268.
- Mikuláš R. (2001a): Gravity and orientated pressure as factors controlling “honeycomb weathering” of the Cretaceous castellated sandstones (northern Bohemia, Czech Republic). *Bull. Czech Geol. Survey*, Praha 76(4): 217–226.
- Mikuláš R. (2001b): Modern and fossil traces in terrestrial lithic substrates. *Ichnos*, Philadelphia 8(2): 177–184.
- Mikuláš R. (2002): Sandstone Modellation Across Climatic Zones and Lithofacies: The Concept of Porokarst. In: Kopřivová L. (ed.), Abstract Book, International Conference Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14–20 September, Doubice in Saxonian-Bohemian Switzerland, p. 25.
- Mikuláš R. (2004): The concept of porokarst: field observations and literary data. – Ms., Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 24 pp.
- Mikuláš R. et al. (2002): Guide to the Post-conference excursion, Sandstone Landscapes: Diversity, Ecology and Conservation, 14–20 September 2002. Bohemian Switzerland National Park Administration, Krásná Lípa, 12 pp.
- Mikuláš R. and Cílek V. (1998): Terrestrial Insect Bioerosion and the possibilities of its fossilization (Holocene to recent, Czech Republic). *Ichnos*, Philadelphia 5: 325–333.
- Mikuláš R., Cílek V. and Adamovič J. (2001): Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje (Geological and geomorphological descriptions of rock cities of the Bohemian Paradise). Ms., Bohemian Paradise Protected Landscape Area, Turnov, 34 pp. (in Czech).
- Mikuláš R., Cílek V. and Mertlík J. (2005): Patterns of sandstone microrelief in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) and adjacent geologic processes. Ms., Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic, 46 pp.
- Mikuláš R., Cílek V., Mertlík J. and Vařilová Z. (2003): Patterns of sandstone microrelief and adjacent geological processes. Ms., Institute of Geology, Academy of Science of the Czech Republic, Praha, 45 pp. (non-paginated).
- Mikyška R. (1970): Poznámky k některým borům v Čechách a v Kladsku. *Preslia*, Praha 42: 130–135.
- Militzer M. (1960): Zur Pflanzenwelt der Sächsischen Schweiz. In: Engelmann G., Im Süden der Barbařině, Werte der deutschen Heimat, Vol. 3, Berlin, pp. 118–135.
- Minsky M. L. and Papert S. A. (1969): Perceptrons. MIT Press, Cambridge MA.
- Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zajac A. and Zajac M. (1995): Vascular Plants of Poland, a Checklist. Pol. Geobot. Studies, Guidebook Series 15: 1–303.
- Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Zajac A. and Zajac M. (2002): Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Kraków, 442 pp.
- Mirov N. T. (1967): The genus *Pinus*. Ronald Press, New York.
- Mitchell C. P. and Millar C. S. (1978a): Mycofloral succession on Corsican pine needles colonized on the tree by three different fungi. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 71: 303–317.
- Mitchell C. P. and Millar C. S. (1978b): Effect of lime and urea on decomposition of senescent corsican pine needles colonized by *Lophodermium pinastri*. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 71: 375–381.
- Mitchell C. P., Millar C. S. and Minter D. W. (1978): Studies on decomposition of scots pine needles. *Trans. Br. Mycol. Soc.* 71: 343–348.
- Mohr K.-H. (1966): Chrysomelidae. In: Freude H., Harde K. W. and Lohse G. A.: Die Käfer Mitteleuropas, Vol. 9, Goecke and Evers, Krefeld, pp. 95–278.
- Moissenet E. and Gautier F. (1971): La région de Rubielos de Mora (Province de Teruel, Chaînes Ibériques Orientales). *Mélanges de la Casa de Velázquez* 7: 5–28.
- Mokma D. L. and Buurman P. (1982): Podzols and podzolization in temperate regions. ISM monograph 1, Int. Soil Museum, Wageningen, pp. 1–126.
- Mooney H. A. and Drake J. A. (eds.) (1986): Ecology of biological invasions of North America and Hawaii. Springer-Verlag, New York, USA.
- Moravec D. and Votýpka J. (1998): Klimatická regionalizace České republiky. Karolinum, Praha, 87 pp. (in Czech).
- Moreno-Casasola P. (1986): Sand movement as a factor in the distribution of plant communities in a coastal dune system. *Vegetatio* 65: 67–76.
- Mrkáček Z. et al. (2000): Ptáci Českého ráje (Birds of the Bohemian Paradise). ZO ČSOP Křižánky, Turnov (in Czech).

SANDSTONE LANDSCAPES

- Müller E. and Arx J. A. von (1962): Die Gattungen der didymosporen Pyrenomyzeten. Beitr. Krypt.-Fl. Schweiz 11/2: 1–922.
- Müller F. (1990): Die Kalkmoosstandorte im Elbsandsteingebirge. Abh. Ber. Naturkundemus. Görlitz 63 (11): 23–29.
- Müller F. (2001): Lieferung von Verbreitungsdaten für gefährdete Moosarten im Nationalpark und Landschaftsschutzgebiet Sächsische Schweiz. Ms., Saxon Switzerland National Park Administration, Bad Schandau.
- Müller F. (2003): *Hygrobiella laxifolia* (Hook.) Spruce – eine neue Lebermoosart für die Tschechische Republik (*Hygrobiella laxifolia* (Hook.) Spruce – a new liverwort of the Czech Republic). Bryonora, Praha 31: 10–13.
- Müller F. and Reimann M. (1999): Beitrag zur Kenntnis der Moosflora von Sachsen II. Sächs. Flor. Mitt. 5: 11–29.
- Müller F. and Reimann M. (2002): Die Moosflora an Kalksandsteinfelsen im sächsisch-böhmischem Grenzgebiet. Sächs. Flor. Mitt. 7: 26–32.
- Musil I. (1971): Pěstování vejmutovy (Pinus strobus L.) v Evropě (White pine (*Pinus strobus* L.) cultivation in Europe). Acta Musei Silesiae, Series C Dendrologica 1971: 168–183 (in Czech).
- Mustoe G. E. (1982): The origin of honeycomb weathering. Geol. Soc. Am. Bull. 93: 1250–1255.
- Myster R. W. (1993): Tree invasion and establishment in old fields at Huscheson-memorial-forest. Botanical Review 59: 251–272.
- Nacev I. and Nacev C. (2001): Pobitite kamani – bakterialno-vodoraslovci koloni (Pobitite kamani – bacterial-algal columns). Sofia, 110 pp. (in Bulgarian).
- Nadachowski A. (1989): Gryzone – Rodentia. In: Kowalski K. (ed.): Historia i ewolucja lądowej fauny Polski (History and evolution of the terrestrial fauna of Poland), Folia Quaternaria, Krakow 59–60: pp. 151–176 (in Polish).
- Nag Raj T. R. (1993): Coelomycetous anamorphs with appendage-bearing conidia. Mycologue Publications, Waterloo, 1101 pp.
- Nagel R. and Voříšková L. (2002): „Káčet nebo nahrazovat?“ Regionální projekt zaměřený na komunikaci v ochraně přírody (To log or to replace? A regional project in nature conservation). Ochrana přírody 57(5): 131–133 (in Czech).
- Náhlík F. (1864): Führer durch die Böhmischa Schweiz. Böhmischa Kamnitz.
- Neruda M. and Neruda R. (2002): To contemplate quantitative and qualitative water features by neural networks method. Plant production 48(7): 5–14.
- Neruda R. (1995): Functional equivalence and genetic learning of RBF networks. In: Pearson D. W., Steele N. C. and Albrecht R. F. (eds.), Artificial neural nets and genetic algorithms, Proc. Int. Conf. Wien, Springer-Verlag, pp. 53–56.
- Neugebauer A. (1986): Pfaffensteine und Neurathen. Pirna.
- Nichols G. (1999): Sedimentology and stratigraphy. Blackwell Science, Malden, Oxford, Melbourne, Berlin.
- Nicoll M. E. and Langrand O. (1989): Madagascar: Revue de la conservation et des aires protégées. World Wide Fund for Nature, Gland, Switzerland.
- Niemczyk V. (1999): Współczesny stan wiedzy geologicznej na temat Górz Stołowych (Geology of the Góry Stołowe Mountains – general outlook). Szczeliniec 3: 3–20 (in Polish).
- Novák M., Bottrelli S. H., Groscheová H., Buzek F. and Černý F. (1995): Sulphur characteristics of two North Bohemian forest catchments. Water, Air and Soil Pollution 85(3): 1641–1646.
- Novák M., Jačková I. and Přechová E. (2001): Temporal trends in the isotope signature of air-borne sulfur in Central Europe. Environ. Sci. Technol. 35: 255–260.
- Nováková D. (2000): Palaeoecology of Small Peat Bogs in the Sandstone Region of the NE Czech Republic. Geolines 11: 129–131.
- Nowotny E. (1940–1941): Sumpfporst und Krähenbeere in den Wekendorfer Felsen. Natur u. Heimat, Aussig 11: 72–73.
- Nožička J. (1957): Přehled vývoje našich lesů (An overview of development of our forests). SZN, Praha.
- Nožička J. (1965): Zavádění vejmutovy v Českých zemích do r. 1938 (Introduction of the white pine in the Czech countries up to the year 1938). Práce Výzkumného Ústavu Lesnického ČSSR 31: 41–67 (in Czech).
- Oberlander T. M. (1989): Slope and pediment systems. In: Thomas D. S. G. (ed.), Arid zone geomorphology, Belhaven, London, pp. 56–84.
- Odin G. S. (ed.) (1988): Green marine clays. Elsevier, Amsterdam.
- Olmer M. and Kessl J. et al. (1990): Hydrogeologické rajóny. Práce a studie, Výzk. úst. vodohosp. Praha, 176: 1–154 (in Czech).
- Olson C. G. and Nettleton W. D. (1998): Paleosols and the effects of alteration. Quatern. Intern. 51/52: 185–194.
- Palice Z., Bayerová Š., Peksa O. and Svoboda D. (2002): Lichenologický výzkum v Národním parku České Švýcarsko. Zpráva za rok 2001–2002 (Lichenological exploration in the Bohemian Switzerland National Park. 2001–2002 Report). Ms., Správa Národního parku České Švýcarsko, Krásná Lípa, 32pp. (in Czech).
- Palmer J. and Radley J. (1961): Gritstone tors of the English Pennines. Zeitschrift für Geomorphologie, NF 5: 37–52.
- Palmer M. W. (1994): Variation in species richness – towards a unification of hypotheses. Folia Geobot. Phytotax. 29: 511–530.
- Palmer M. W., Arevalo J. R., Cobo M. D. and Earls P. G. (2003): Species richness and soil reaction in a northeastern Oklahoma landscape. Folia Geobotanica 38: 381–389.
- Paluš M., Novotná D. and Zvelebil J. (2004): Fractal Rock Slope Dynamics Anticipating a Collapse. Phys. Rev. E. 70: 3.
- Panoš V. and Skácel J. (1966): Zur Frage der Entstehung der Steinsäulen „Pobitite Kameni“ und anderer eigenartiger Formen zwischen Varna und Beloslav in Nordost-Bulgarien. Zeitschrift für Geomorphologie, N. F. 10(2): 105–118.

REFERENCES

- Papazova N. (2004): Personal communication by e-mail of 2 February 2004.
- Parent G. H. (1997): *Atlas des Ptéridophytes des régions lorraines et vosgiennes, avec les territoires adjacents*. Travaux scientifiques du Musée National d'Histoire Naturelle de Luxembourg 25, 304 pp.
- Parent G. H., Jérôme C. and Thorn R. (1996): Données nouvelles sur la répartition d'*Asplenium trichomanes* L. subsp. *pachyrachis* (Christ) Lovis and Reichstein (Aspleniaceae, Pteridophyta) en Belgique, au Grand-Duché de Luxembourg, en Allemagne et dans le Nord-Est de la France. *Le Monde des Plantes* 457: 29–30.
- Parkhurst D. and Appelo C. A. J. (2001): User's Guide to PHREEQC (version 2). A Computer Program for Speciation, Batch-reaction, One-Dimensional Transport, and Inverse Geochemical Calculation.
- Pásková M. and Řídkošil T. (2006): Český ráj první geopark v nových zemích EU (Bohemian Paradise the first UNESCO Geopark in the new EU countries). *Ochrana přírody* 61: 11–13, Praha (in Czech).
- Passarge H. (1981): Pflanzengesellschaften im Zittauer Bergland. *Abh. Ber. Naturkundemus.* 54(4), Gorlitz: 1–48.
- Paton J. A. (1954): A bryophyte flora of the sandstone rocks of Kent and Sussex. *Transactions of the British Bryological Society* 2: 349–374.
- Paton J. A. (1956): Bryophyte succession on the Wealden sandstone rocks. *Transactions of the British Bryological Society* 5: 103–114.
- Pax F. (1927): Die subalpine Flora der Sudeten. Englers Botanisch. Jarhb. 61. 1: 285–520.
- Peichlová M. (1979): Historie vegetace Broumovska (Vegetation history of the Broumovsko region). CSc. thesis, Botanický ústav ČSAV, Brno (in Czech).
- Peksa O., Svoboda D. and Zelinková J. (2004): Lichenologický výzkum v Národním parku České Švýcarsko. Zpráva za rok 2004 (Lichenological exploration in the Bohemian Switzerland National Park. Report for the year 2004). Ms., Správa Národního parku České Švýcarsko Krásná Lípa, 29 pp. (in Czech).
- Pel L., Huinink H. and Kopinga K. (2003): Salt transport and crystallization in porous building materials. *Magnetic Resonance Imaging* 21: 317.
- Peña J. L. and Echeverría M. T. (1991): Geomorfología del área de Alcañiz (Teruel). Al-Qannis 2.
- Peña J. L., Longares L. A. and Espinalt M. (2000): Paisajes naturales de la provincia de Teruel. Guías Temáticas. Instituto de Estudios Turoenses, Teruel.
- Pender K. (1996): Roślinność Górz Stołowych w aspekcie środowiskowych i antropogenicznych uwarunkowań (The Vegetation of the Stołowe Mts. with respect to the Environmental and Anthropogenic Conditions). In: Ogorzałek A., Sympozjum naukowe Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Górz Stołowych, Szczeliniec, 1996, pp. 103–109 (in Polish).
- Pentecost A. (1991): The weathering rates of some sandstone cliffs, Central Weald, England. *Earth Surface Processes & Landforms*, 16: 83–91.
- Pentecost A. and Rose F. (1985): Changes in the cryptogram flora of the Wealden sandrocks. *Botanical Journal of the Linnean Society* 90: 217–230.
- Peša V. (1999): Pravěké rituály v Polomených horách (The prehistoric rituals in Polomené hory Mountains). Kuděj, Praha 2: 3–10 (in Czech).
- Peša V. (2002): Člověk a jeskyně v novověku (1500–2000) (Men and Caves in the New Age (1500–2000)). Kuděj, Praha 4/1: 3–19, 4/2: 3–19 (in Czech).
- Peša V. (2004): Podzemní lomy na Českolipsku (Underground quarries in the area of Česká Lípa). Bezděz, Česká Lípa 13: 83–122 (in Czech).
- Peša V. and Jenč P. (2003a, 2004, 2006): Pravěké, středověké a novověké lokality Českého Švýcarska I, II, III (Prehistoric, Medieval and modern sites in the Bohemian Switzerland area I, II). In: Belisová N. (ed.), Minulosti Českého Švýcarska, Krásná Lípa, 1: 56–79; 2: 43–53, 3: 89–104 (in Czech).
- Peša V. and Jenč P. (2003b): Dokumentace historických skalních rytin v Labských pískovcích v letech 2001–2002, předběžná zpráva (Researches in the historical rock engravings in the Elbe Sandstones in 2001–2002, preliminary report). Porta Bohemica, Litoměřice 2: 139–145 (in Czech).
- Peshev Tz. (1987): Bulgaria. In: Sterling K. (ed.), *An International History of Mammalogy*, Vol. I., One World Press, Bel. Air, Maryland, pp. 1–198.
- Pessel W. (1896): Thätigkeitsberichte der einzelnen Abtheilungen. In: Erstes Jahrzehnt-Buch des Gebirgsvereines für das nördliche Böhmen. Schönlinde.
- Petříček V. (1987): Vegetační poměry státní přírodní rezervace Kokořínský důl (Vegetation of the Kokořínský důl state nature reserve). *Sborn. Severočes. Muz., Ser. Natur., Liberec*, 16: 67–96 (in Czech).
- Pettijohn F. J., Potter P. E. and Siever R. (1987). *Sand and sandstone*. Springer Verlag, New York, Heidelberg.
- Pfeffer A. (1955): Fauna ČSR. 6. Kůrovci – Scolytidae (Řád: Brouci – Coleoptera) (Bark beetles – Scolytidae). Nakladatelství ČSAV Praha, 324 pp. (in Czech).
- Pfeifer N., Kraus K. and Köstli A. (1999): Restitution of airborne laser scanner data in wooded areas. *GIS* 12(2): 18–21.
- Phillips A. et al. (2003): Benefit Beyond Boundaries. Work in the UK's Protected Areas. Council for National Parks, London, 23 pp.
- Phillips J. D. (1999): *Earth Surface Systems, Complexity, Order and Scale*. Blackwells, Oxford, 180 pp.
- Pickett S. T. A., Kolasa J., Armesto J. and Collins B. (1989): The ecological concept of disturbance and its expression at various hierarchical levels. *Oikos* 54:129–136.
- Pignatti S. (1978): *Piani di vegetazione in Italia* (Vegetation belts

SANDSTONE LANDSCAPES

- in Italy). *Giornale Botanico Italiano* 113(5-6): 411–428 (in Italian).
- Piper D. J. W. (1971): Pleistocene superficial deposits, Balcombe area, Central Weald. *Geological Magazine* 108: 517–523.
- Pižl V. (1983): *Helodrilus oculatus* (Oligochaeta, Lumbricidae), neu für die Fauna der Tschechoslowakei. *Věst. Čs. Společ. Zool.* 47: 288–289.
- Pižl V. (1985): *Nicodrilus ictericus* and *Eiseniella tetraera* f. *popi* (Oligochaeta, Lumbricidae) recorded in Czechoslovakia. *Věst. Čs. Společ. Zool.* 49: 18–22.
- Pižl V. (1986): Žížaly (Oligochaeta, Lumbricidae) rezervace Růžák na Děčínsku (Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) of the Růžák Nature Reserve in Děčínsko region). *Sborn. Severočes. Muz., Přír. Vědy, Liberec* 15: 69–76 (in Czech).
- Pižl V. (1994): Supplementary records of earthworms (Lumbricidae) in the Czech Republic. *Acta Soc. Zool. Bohem.* 58: 205–211.
- Pižl V. (1997): Žížaly (Oligochaeta, Lumbricidae) chráněné krajinné oblasti Labské pískovce (Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) of the Protected Landscape Area Labské pískovce). *Sborník Okr. muzea v Mostě, Řada přírodovědná* 19: 9–18 (in Czech).
- Pižl V. (2002a): Earthworms (Lumbricidae) of the Bohemian Forest. *Silva Gabreta* 8: 143–148.
- Pižl V. (2002b): Žížaly České republiky (Earthworms of the Czech Republic). *Sborník přírodověd. klubu v Uh. Hradišti, Supplementum* 9: 1–154 (in Czech).
- Plánská M., Rychtařík P. and Rychtaříková L. (2002): Chráněná krajinná oblast Lužické hory (Lusatian Mountains Protected Landscape Area). In: Mackovčn P., Sedláček M. and Kuncová J. (eds.), Liberecko, Chráněná území ČR (Liberecko region, Protected areas of the Czech Republic), Vol. 3, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Ekocentrum Brno, Praha pp. 271–294 (in Czech).
- Podroužek K. (1997): „Barušky“ – lidová architektura v pískovcovém podloží (“Barušky” – folk architecture in the sandstone rock). *Průzkumy památek*, Praha 1997/2: 57–65 (in Czech).
- Pokorný P. (2003): Nálezy rostlinných makrozbytků v Jezevčím převisu. In: Svoboda J. (ed), Mezolit severních Čech, Dolnověstonické studie, vol. 9, Brno (in Czech), pp. 272–273.
- Pokorný P. (2005): Role of man in the development of Holocene vegetation in Central Bohemia. *Preslia*, Praha 77: 113–128.
- Pokorný P. and Kuneš P. (2005): Holocene acidification process recorded in three pollen profiles from Czech sandstone and river terrace environments. *Ferrantia* 44: 101–107.
- Ponge J. F. and Delhay L. (1995): The heterogeneity of humus profiles and earthworm communities in a virgin beech forest. *Soil Biol. Biochem.* 20: 24–32.
- Potter P. E. and Pettijohn F. J. (1963): Paleocurrents and basin analysis. Springer Verlag, Berlin, Göttingen, Heidelberg.
- Pražák J., Chaloupský J., Kačura G. and Shrbený O. (1970): Vysvětlující text k základní geologické mapě 1 : 25 000 (Comments on the Basic Geological Map 1 : 25 000), list M-33-41-B-c Růžová. ÚÚG. Geofond, Praha (in Czech).
- Prigogine I. and Stengers I. (1984): Order out of Chaos; Man's New Dialogue with Nature. Bantam Books, New York.
- Příhoda A. (1959): Lesnická fytopatologie. Praha, SZN.
- Prinz K. (1930): Über das Vorkommen des Riesen-Schachtelhalmes im Gebiete der mittelgebirgischen Randbrüche in Nordböhmien (*Equisetum Telmateia* Erhart = *E. maximum* Link). *Natur u. Heimat, Aussig* 1: 41–44.
- Prinz K. (1937): Aus dem Wandertagebuch der B. A. G. Natur u. Heimat, Aussig 8: 98–101.
- Prinz K. (1941): Die Vegetation der nordböhmischen Tonmergel im Gebiete der mittelgebirgischen Randbrüche. *Natur u. Heimat* 12, Aussig: 36–40.
- Prošek F. and Ložek V. (1952): Mesolitické sídliště v Zátyní u Dubé (The Mesolithic Station at Zátyní near Dubá). *Antropozoikum*, Praha 2: 95–160 (in Czech).
- Puente J. (2004): Guía de la flora de la depresión del Ebro. Publicaciones del Consejo de Protección de la Naturaleza de Aragón, Serie Difusión 9, Zaragoza.
- Pujmanová L. (1998): Mikroklima sutí vrchu Kamennec v Českém středohoří (The microclimate of rock debris of Kamennec hill in České středohoří Mts.). In: Cílek V. and Kopecký J., (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief, Knihovna České speleologické společnosti, Vol. 32, Praha, pp. 37–40 (in Czech).
- Pulinowa M. (1989): Rzeźba Górz Stołowych (The relief of the Góry Stołowe Mountains). *Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego* 1008: 1–218 (in Polish).
- Pyatt E. C. (1947): Sandstone Climbs in South-East England. Publications Sub-Committee of the London Section of the Junior Mountaineering Club of Scotland, 48 pp.
- Pyatt E. C. (1956, revised 1963 and 1969): A Climber's Guide to South-East England. The Climbers' Club.
- Pye K. and Lancaster N. (eds.) (1995): Aeolian sediments, ancient and modern. Series 16, Blackwell Science, Oxford.
- Pyšek P. (1985): Contribution to the village flora of the Bohemian Karst. *Zprávy Čs. Bot. Společ.* 20: 69–77 (in Czech).
- Pyšek P. (1993): What do we know about *Calamagrostis villosa*? A review of the species behaviour in secondary habitats. *Preslia*, Praha 65: 1–20.
- Pyšek P., Prach K. and Rejmánek M. (eds.) (1995): Plant invasions. General aspects and special problems. Academic Publishing, Amsterdam.
- Pyšek P., Sádlo J. and Mandák B. (2002): Catalogue of alien plants of the Czech Republic. *Preslia* 74: 97–186.
- Pyšek P., Sádlo J., Mandák B. and Jarošík V. (2003): Czech alien flora and historical pattern of its formation: what came first to Central Europe? *Oecologia* 135: 122–130.
- Rabenhorst L. (1870): Kryptogamen-Flora von Sachsen, der Ober-

REFERENCES

- Lausitz, Thüringen und Nord-Böhmen mit Berücksichtigung der benachbarten Länder. Zweite Abtheilung. Die Flechten. E. Kummer, Leipzig.
- Radwański S. (1959): Budowa geologiczna obniżenia dusznickiego i wschodniej części Górz Stołowych (The geology of the Duszniki Basin and eastern part of the Góry Stołowe Mountains). Biuletyn Instytutu Geologicznego 146: 5–56 (in Polish).
- Radwański S. (1966): Faje osadowe i charakterystyka faunistyczna górnej kredy Środkowych Sudetów (Characteristic of facies and fauna in the Upper Cretaceous rocks in the Middle Sudetes). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 36(2): 99–119 (in Polish).
- Radwański S. (1968): Cretaceous deposits of the Central Sudetes. Biuletyn Instytutu Geologicznego 227.
- Radwański S. (1975): Kreda Sudetów Środkowych w świetle wyników nowych otworów wiertniczych (Cretaceous rocks – interpretation of new geological boreholes). Biuletyn Instytutu Geologicznego 287: 5–50 (in Polish).
- Ralska-Jasiewiczowa M. (1989): Type region P-e: The Bieszczady Mts. Acta Palaeobotanica 29: 31–35.
- Ranoszek W. (1998): Morfologia progów tektonicznych obramowujących rów górnej Nysy (The morphology of tectonic scarps framing Upper Neisse tectonic graben). Acta Universitatis Wratislaviensis, 2061, Prace Instytutu Geograficznego seria A, Geografia Fizyczna 9: 23–35 (in Polish).
- Rasbach H., Rasbach K. and Jérôme C. (1993): Über das Vorkommen des Hautfarns *Trichomanes speciosum* (Hymenophyllaceae) in den Vogesen (Frankreich) und dem benachbarten Deutschland. Carolinea 51: 51–52.
- Rast H. (1958): Geologischer Führer durch das Elbsandsteingebirge. – Bergakademie Freiberg, 224 pp.
- Rattenbury G. (1986): A study of the weathering features of the Ardingly Sandstone. Undergraduate dissertation, Combined Studies (Geography), University of Brighton, UK, pp. 1–74.
- Reading H. G. (ed.) (1986): Sedimentary environments and facies. Blackwell Scientific Publishers, Oxford.
- Reichling L. (1954): L'élément atlantique dans la vallée inférieure de l'Ernz Noire. Archives de l'Institut Grand-Ducal, Section des Sciences, 21: 99–114.
- Reichling L. (1964): Notes floristiques. Observations faites dans le G.-D. de Luxembourg de 1962 à 1964. Bull. Soc. Nat. Luxemb. 69: 54–53.
- Rejmánek M. (1969): Vegetační a květěnné poměry Ostaše a Hejdy v Polické pánvi (Vegetation and floristic characteristics of Ostaš and Hejda hills in the Police Basin). Pr. Muz. Hradec Králové, ser. A, sci. natur., 9 (1968): 53–80 (in Czech).
- Rejmánek M. (1971): Ecological meaning of the thermal behaviour of rocks. Flora, Jena 160: 527–561.
- Rejmánek M. and Richardson D. M. (1996): What attributes make some plant species more invasive? Ecology 77: 1655–1661.
- Retallack G. J. (1990): Soils of the past: an introduction to paleopedology. Allen and Unwin, London, 520 pp.
- Richardson D. M. and Higgins S. I. (1998): Pines as invaders in the southern hemisphere. In: Richardson D. M. (ed.), Ecology and biogeography of *Pinus*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 450–473.
- Richardson D. M., Pyšek P., Rejmánek M., Barbour M. G., Panetta F. D. and West C. J. (2000): Naturalization and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distribution 6: 93–107.
- Richter A. (1925): Festschrift für die Feier des 40-jährigen Bestandes des Gebirgsvereines für das nördlichste Böhmen 1885–1925. Rumburk.
- Riebe H., Härtel H., Bauer P. and Benda P. (1999): Die Naturausstattung der Sächsisch-Böhmischen Schweiz. Nationalpark Sächsische Schweiz, Bad Schandau 3: 20–57.
- Riehmer E. (1926): Die Laubmoose Sachsen. 1. Hälfte. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden 1925: 24–72.
- Riehmer E. (1927): Die Laubmoose Sachsen. 2. Hälfte. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden 1926: 17–95.
- Rivas-Godoy S. and Borja J. (1961): Estudio de Vegetación y Flórula del Macizo de Gúdar y Jabalambre. Anales Inst. Bot. Cavanilles 19: 3–543.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1976): Aspects of the geomorphology of the sandstone cliffs of the central Weald, Proceedings of the Geologists' Association 87: 93–100.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1981): Sandstone cliffs on the High Weald Landscape. Geographical Magazine 53: 587–592.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1984): Classic landforms of the Weald. Geographical Association, Sheffield.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1987): Surface crusting of sandstones in southern England and northern France. In: Gardiner V. (ed.), International Geomorphology 1986, II, J. Wiley, New York, pp. 623–635.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1994): Sandstone weathering and landforms in Britain and Europe. In: Robinson D. A. and Williams R. B. G. (eds.), Rock Weathering and Landform Evolution, J. Wiley Chichester, pp. 371–391.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (1996): An analysis of the weathering of Wealden sandstone churches. In: Smith B. J. and Warke P. A. (eds.), Processes of Urban Stone Decay, Donhead, London, pp. 133–149.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (2000a): Experimental weathering of sandstone by combinations of salts. Earth Surf. Process. Landforms 25: 1309–1315.
- Robinson D. A. and Williams R. B. G. (2000b): Accelerated weathering of a sandstone in the High Atlas Mountains of Morocco by an epilithic lichen. Z. Geomorph. N. F. 44(4), Berlin, Stuttgart: 513–528.
- Robinson W. (1914): Home Landscapes. Murray, London.
- Rodríguez-Navarro C., Doehe E. and Sebastian E. (1999): Origins

SANDSTONE LANDSCAPES

- of honeycomb weathering: The role of salts and wind. GSA Bulletin 111(8): 1250–1255.
- Rogaliński J. and Słowiok G. (1958): Rzeźba Górz Stołowych w świetle teorii pedyplanacji (The relief of the Góry Stołowe Mountains in the light of pedyplanation theory). Czasopismo Geograficzne 39: 473–483 (in Polish).
- Rompaey E. van and Delvosalle L. (coll. de Langhe J. E., D'hose R., Lawalrée A., Reichling L., Schumacker R., Vanhecke L. and Vannerom H.) (1979): Atlas de la flore belge et luxembourgeoise, ptéridophytes et spermatophytes. Ed. 2, Jardin botanique national de Belgique, Meise, 1542 maps.
- Rosenberg N. J. (1974): Microclimate: The biological environment. John Wiley and Sons, New York.
- Rotnicka J. (1996): Stratygrafia i litologia tzw. margli plenerskich (Stratigraphy and lithology of the so-called Planermergel). In: Ogorzałek A., Sympozjum naukowe Środowisko Przyrodnicze Parku Narodowego Górz Stołowych, Szczeliniec, 1996, pp. 21–26 (in Polish).
- Rozsypal A. (2001): Kontrolní sledování a rizika v geotechnice. Jaga Group, Bratislava, 198 pp. (in Czech).
- Rubín J. and Balatka B. (eds.) (1986): Atlas skalních, zemních a půdních tvarů (Atlas of rock, ground and soil forms). Academia, Praha, 388 pp. (in Czech).
- Růžička V. (1992): Current results of an arachnological survey of some sandstone rock sites in Bohemia (so-called “rock cities”). Arachnol. Mitt. 3: 1–15.
- Růžička V. (1994): Spiders of the Průčelská Rokle defile, Klíč Mt. and Zlatník Mt. in North Bohemia. Fauna Bohem. Septentr. 19: 129–158.
- Růžička V. (1998a): Dosavadní výsledky arachnologického průzkumu pískovcových skalních měst (Present results of arachnological research of sandstone rock cities). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief (Sandstone phenomenon: climate, life and relief), Knih. Čes. Speleol. Společ., Praha & Broumov, Vol. 52, pp. 113–125 (in Czech).
- Růžička V. (1998b): Mikroklima a bezobratlé živočichové pseudokrasových terénů (The microclimate and Invertebrates of sandstone pseudokarst). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief (Sandstone phenomenon: climate, life and relief), Knih. Čes. Speleol. Společ., Praha & Broumov, Vol. 52, pp. 33–36 (in Czech).
- Růžička V. (2000): Spiders in rocky habitats in Central Bohemia. J. Arachnol. 28: 217–222.
- Růžička V., Hajer J. and Zacharda M. (1995): Arachnid population patterns in underground cavities of a stony debris field (Araneae, Opiliones, Pseudoscorpionidea, Acari: Prostigmata, Rhagidiidae). Pedobiologia 39: 42–51.
- Růžička V. and Kopecký J. (1994): Spiders of pseudokarst caves in northeastern Bohemia. Boll. Acc. Gioenia Sci. Nat. 26 (345) [1995]: 299–309.
- Růžička V. and Kopecký J. (1998): Pavouci pseudokrasových jeskyní v severovýchodních Čechách (Spiders of pseudokarst caves in the north-eastern Bohemia). In: Cílek V. and Kopecký J. (eds.), Pískovcový fenomén: klima, život a relief (Sandstone phenomenon: climate, life and relief), Knih. Čes. Speleol. Společ., Praha & Broumov, Vol. 52, pp. 102–112 (in Czech).
- Rydgren K., Hestmark G. and Økland R. H. (1998): Revegetation following experimental disturbance in a boreal old-growth *Picea abies* forest. J. Veg. Sci. 9: 763–776.
- Sächsische Landesanstalt für Landwirtschaft (2000): Der Elblachs ist zurück – Der Beginn einer Wiedereinbürgerung. Selbstverlag, Dresden, 25 pp.
- Sádlo J. (1996): Náčrt vegetace CHKO Kokořínsko (An outline of the vegetation of the Kokořínsko Protected Landscape area). Příroda, Praha 7: 143–167 (in Czech).
- Sádlo J. (1998): *Dryopteris cristata* v rašelinných rákosinách na Jestřebsku. (*Dryopteris cristata* in mire reed beds in Jestřebí area). Muzeum a současnost, Roztoky, Ser. Natur. 12: 19–24 (in Czech).
- Sádlo J. (2000): Původ travinné vegetace slatin v Čechách (The origin of grassland vegetation of fens in Bohemia). Preslia 72: 495–506 (in Czech).
- Sádlo J. and Storch D. (2000): Biologie krajiny. Vesmír, Praha, 94 pp. (in Czech).
- Sakalyan M. and Meyni K. (eds.) (1993): Bulgaria's Biological Diversity: Conservation Status and Need Assessment, Vol. I, II. Pensoft, Sofia & Moskow, 830 pp.
- Salisbury E. (1952): Downs and Dunes. Their plant life and its environment. G. Bell and Sons, London.
- Samyn J. M. (2001): Plantes utiles des hautes terres de Madagascar. Alain Petitjean Editeur, Sainte Clotilde, 81 pp.
- Sapoundžieva V. and Yanev Y. (1984): Faunata ot pyasachnitite kraji gr. Djebel, Iztochni Rodopi (Fauna from the sandstones near Djebel, East Rhodopes). Rev. Bulg. Geol. Soc., 45(4): 308–317 (in Bulgarian).
- Savoie J.-M. and Gourbière F. (1989): Decomposition of cellulosa by the species of the fungal succession degrading *Abies alba* needles. FEMS Microb. Ecol. 62: 307–314.
- Schade A. (1924): Die Lebermoose Sachsen. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden 1922–23: 3–70.
- Schade A. (1936): Nachträge zum Standortsverzeichnis der Lebermoose Sachsen nebst einigen kritischen Bemerkungen. Abh. Naturw. Ges. Isis, Dresden 1935: 18–86.
- Schäfer T. (1878): Sächsische Schweiz. 2. Ed., Dresden.
- Schatz G. E. (2001): Generic Tree Flora of Madagascar. Royal Botanic Gardens Kew and Missouri Botanical Garden, 477 pp.
- Scheu S. and Falca M. (2000): The soil food web of two beech forests (*Fagus sylvatica*) of contrasting humus type: stable isotope analysis of a macro- and a mesofauna-dominated community. Oecologia 125: 285–296.
- Scheybal J. and Scheybalová J. (1985): Umění lidových tesařů,

REFERENCES

- kameníků a sochařů v Severních Čechách (Art of folk carpenters, stonecutters and sculptors in northern Bohemia). Ústí nad Labem (in Czech).
- Schmidt J. and Dikau R. (2004): Modeling historical climate variability and slope stability. *Geomorphology*, Vol. 60, 3–4, pp. 433–447.
- Schmidt K.-H. (1991): Lithological differentiation of structural landforms on the Colorado Plateau. *Earth Surf. Proc. Landf.* 14: 93–105.
- Schmidt K.-H. (1994): The groundplan of cuesta scarps in dry regions as controlled by lithology and structure. In: Robinson D. A. and Williams R. B. G. (eds.), *Rock Weathering and Landform Evolution*, John Wiley and Sons, Chichester, pp. 355–368.
- Schmidt P. A. (1995): Übersicht der natürlichen Waldgesellschaften Deutschlands. Schriftenreihe Sächs. Landesanst. Forsten, Vol. 4, Graupa.
- Schmidt P. A. and Löffler B. (1996): Abschlußbericht zum Projekt „Vegetationskundliche Untersuchungen der Wälder im Nationalpark Sächsische Schweiz“. Ms., TU Dresden, Fakultät Forst-, Geo- und Hydrowissenschaften, Tharandt.
- Schmithüsen J. (1940): Das Luxemburger Land, Landesnatur, Volkstum und bäuerliche Wirtschaft. Verlag S. Hirzel, Leipzig, 431 pp.
- Schmuck A. (1960): Rejonizacja pluviotermiczna Dolnego Śląska (Pluviothermic regions of Lower Silesia). Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu, Ser. V. Melioracja 27: 3–15 (in Polish).
- Scholes M. C. and Nowicki T. E. (1998): Effects of pines on soil properties and processes. In: Richardson D. M. (ed.), *Ecology and Biogeography of Pinus*, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 341–355.
- Schumm S. A. and Chorley R. J. (1966): Talus weathering and scarp recession in the Colorado Plateaus. *Zeitschrift für Geomorphologie N.F.* 10: 11–35.
- Schweingruber F. H., Eckstein D., Serre-Bachet F. and Bräker O. U. (1990): Identification, presentation and interpretation of event years and pointer years in dendrochronology. *Dendrochronologia* 8: 8–38.
- Schwenninger J.-L. (1988): *Hymenophyllum tunbrigense* (L.) Sm. Rapport d'étude sur l'écologie et la conservation de l'espèce. Ms., Ministère de l'Environnement. Administration des Eaux et Forêts.
- Schwenninger J.-L. (2001): Inventaire phytosanitaire et conservation des populations relictuelles de *Hymenophyllum tunbrigense* [L] Smith (Hymenophyllaceae: Pteridophyta) au Grand-Duché de Luxembourg. Ms., Ministère de l'Environnement, Administration des Eaux et Forêts.
- Schwenninger J.-L. and Krippel Y. (2002): Population survey and conservation of Tunbridge Filmy-Fern in the Grand-Duchy of Luxembourg. *Fern Gaz.* 16 (6, 7, 8): 453.
- Scrutton C. (ed.) (1994): *Yorkshire rocks and landscape: a field guide*. Yorkshire Geological Society.
- Seifert A. (1959): Gerichtete Brauneisenanreicherungen im Elbsandsteingebirge (Brauneisenschwarten und -röhren). Abh. Sächs. Geol. Landesamts, Freiberg 19: 1–38.
- Selby M. J. (2000): *Hillslope Materials and Processes*. Ed. 2, Oxford University Press, Oxford.
- Ševelová M., Raclavská H. and Matýsek D. (1998): Aluminium Speciation in Aquatic Ecosystems. Ms., Technical University of Ostrava (in Czech).
- Shugart H. H., Leemans R. and Bonan G. B. (1992): A system analysis of the global boreal forest. Cambridge University Press, Cambridge.
- Šika A. and Vinš B. (1971): Růst vejmutovky v lesních porostech v Čechách a na Moravě (Growth of the white pine in forest plantations in Bohemia and Moravia). *Acta Musei Silesiae*, Series C Dendrologica 1971: 130–135 (in Czech).
- Šilar J. (1975): Aplikace výzkumu přírodních radionuklidů, tritia a radiouhlíku v hydrogeologickém výzkumu. *Geologické práce*, GÚDŠ, Bratislava, Správy 62: 77–83 (in Czech).
- Šíma J. and Neruda R. (1997): Teoretické otázky neuronových sítí (Theoretical questions of neural network). MatfyzPress, MFF UK, Praha (in Czech).
- Skalická A. and Skalický V. (1988): *Larix*, modřín. (*Larix*, Larch). In: Hejný S. and Slavík B. (eds.), Květěna České socialistické republiky 1, Academia, Praha, pp. 308–312 (in Czech).
- Skalický V. (1988): Regionálně fytogeografické členění (Regional phytogeographic division). In: Hejný S. and Slavík B. (eds.), Květěna České socialistické republiky, Academia, Praha, 1: 103–121 (in Czech).
- Skoček V. and Valečka J. (1983): Paleogeography of the Late Cretaceous Quadersandstein of Central Europe. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology* 44: 71–92.
- Slavík B. (1977): Floristicko-fytogeografická charakteristika Českého ráje z hlediska ochrany přírody (Floristic-phytogeographic characteristic of the Bohemian Paradise from the nature conservation point of view). *Bohem. Centr., Praha* 6: 43–123 (in Czech).
- Sokal R. R. and Rohlf F. J. (1995): *Biometry*. Ed. 3, WH Freeman, New York, 887 pp.
- Soukup F., Pešková V. and Liška J. (2000): Odumírání vejmutovky v Labských pískovcích (White Pine dying in the Elbe Sanstones). *Lesnická práce* 79(6): 265–267 (in Czech).
- Soukupová J., Hradil D. and Příkryl R. (2002): Chemical weathering of clay – rich sandstone matrix: controls and case studies. In: Příkryl R. and Viles H. A. (eds.), *Understanding and managing stone decay*, Karolinum Press, Prague, pp. 263–271.
- Soukupová J. and Příkryl R. (2002): Isotopic composition of salt efflorescence from the sandstone exposed in rock cities of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). In: Book of

SANDSTONE LANDSCAPES

- abstracts, Abstracts to the international conference BIOGEOMON, 17.-22. 8. 2002, Reading, U. K., p. 69.
- Sourdat M. (1970): Sur l'évolution du massif de l'Isalo et du bassin de l'Onilahy (Sud-Ouest de Madagascar): notes de géomorphologie. *Madagascar. Rev. Géogr.* 16: 105–118.
- Souto X. C., Bolano J. C., Gonzalez L. and Reigosa M. J. (2001): Allelopathic effects of tree species on some soil microbial populations and herbaceous plants. *Biologia Plantarum* 44: 269–275.
- Spratt T. (1856): On the geology of Varna and its vicinity and of other parts of Bulgaria. *Quarterly Journal Geol. Soc. of London* 12: 387–388.
- Špůrek M. (1967): Historická analýza působení sesuvného faktoru v Českém masívu (Historical analysis of landslide occurrence in the Bohemian Massif). CSc. thesis, ÚSMH, Academy of Science of the Czech Republic (in Czech).
- Špůrek M. (1973): Retrospection and Prognosis of Landslide Calamities. *Čas. Miner. Geol.*, Praha, 19, 2: 119–134.
- Spurk M. (1997): Dendroklimatologische Untersuchungen an Kiefern (*Pinus sylvestris* L.) der planar-kolinnen Stufe in Deutschland. *Dendrochronologia*, 15: 51–72.
- Sroka W. (1997): Ewolucja morfotektoniczna Sudetów w rejonie Kotliny Kłodzkiej w świetle analizy morfometryczno-statystycznej (Morphotectonic evolution of the Sudetes in the Kłodzko Basin with application of morphometric and statistic analysis). *Acta Universitatis Wratislaviensis*, 1939, Prace Geologiczno-Mineralogiczne 57: 97 pp. (in Polish).
- Staffa M. (1992): Słownik geografii turystycznej Sudetów. T. 15. Góry Stołowe (Tourist's geographic dictionary of the Sudety Mts. Vol. 15. Stołowe Mts.). Wydawnictwo PTTK "Kraj", Warszawa – Kraków, 279 pp. (in Polish).
- Ständige Arbeitsgruppe der Biosphärenreservate in Deutschland. (1995): Biosphärenreservate in Deutschland. Leitlinien für Schutz, Pflege und Entwicklung. Springer, 371 pp.
- Stein J. (1991): Nationalpark Sächsische Schweiz – Von der Idee zur Wirklichkeit. In: Sonderheft zur Eröffnung des Nationalparks Sächsische Schweiz, Königstein, pp. 10–17.
- Stein J. and Hentschel W. (1999): Elbsandsteingebirge: Zwei Schutzgebiete – eine Landschaft. Labské pískovce: dvě chráněná území – jedna krajina. Schriftenreihe des Nationalparks Sächsische Schweiz, Königstein 3: 4–19.
- Stellwag K. (1950): Funde aus Drum bei B. Leipa. *Sudeta* 6: 156–157.
- Stewart J. R. and Lister A. M. (2001): Cryptic northern refugia and the origins of the modern biota. *Trends Ecol. Evol.* 16(11): 608–615.
- Stolle E. (1938): Die Torfmoose Sachsen I. Abh. Naturw. Ges. Isis Dresden 1936–37: 85–132.
- Stolle E. (1940): Die Torfmoose Sachsen II. Abh. Naturw. Ges. Isis Dresden 1938–39: 112–164.
- Storch G. (1995): Local differences of faunal exchange at the Pleistocene-Holocene boundary. *Courier Forch. Inst. Senckenberg* 153: 135–142.
- Stoutjesdijk P. H. and Barkman J. J. (1992): Microclimate, vegetation and fauna. Opulus Press AB, Uppsala.
- Strumia G., Wimmer R. and Grabner M. (1997): Dendroclimatic sensitivity of *Pinus nigra* Arnold in Austria. *Dendrochronologia* 15: 129–137.
- Stumm W. and Morgan J. J. (1981): Aquatic chemistry. John Wiley and Sons, New York.
- Sturm V. (1965): Deutsche Naturparke. Ed. 2, Verein Naturschutzwirkung e. V., Stuttgart, 324 pp.
- Sutton B. C. (1980): The Coelomycetes. Commonwealth Mycological Institute, Kew, 696 pp.
- Švestka M., Hochmut R. and Jančářík V. (1996): Praktické metody v ochraně lesa (Practical methods in forest protection). Silva Regina, 309 pp. (in Czech).
- Svoboda J. (1977): The Mesolithic settlement in the region of Polomené Mts. (North Bohemia). *Anthropologie*, Brno 15: 123–136.
- Svoboda J. (1979): Stratigraphy of the Mesolithic settlement in the rockshelter at Heřmánky (Polomené Mts., North Bohemia). *Anthropologie*, Brno 17: 87–93.
- Svoboda J. (1983): Mesolithic dwelling structures in the rockshelter Heřmánky I, North Bohemia. *Anthropologie*, Brno 21: 159–168.
- Svoboda J. A. (ed.) (2003): Mezolit severních Čech. Komplexní výzkum převisů na Českolipsku a Děčínsku, 1978–2003. Mesolithic period in Northern Bohemia. Complex excavation of rockshelters in the Česká Lípa and Děčín areas, 1978–2003. The Dolní Věstonice Studies, Brno 9: 1–328.
- Svoboda J., Cílek V. and Jarošová L. (1998): Zum Mesolithikum in den Sandsteingebieten Nordböhmens. *Archäologisches Korrespondenzblatt*, Frankfurt a. M. 28: 357–372.
- Svoboda J., Cílek V. and Jarošová L. (1999): Mezolit na Českolipsku. Poznámky k současnému stavu výzkumu (Mesolithic in Česká Lípa region, remarks on the present stage of research). Bezděz, Česká Lípa 8: 11–34 (in Czech).
- Svoboda J., Cílek V., Jarošová L. and Peša V. (1999): Mezolit z perspektivy regionu: výzkumy v ústí Pekla (Mesolithic from the regional perspective: Excavations in the Peklo Valley). *Archeologické rozhledy*, Praha 51: 243–264 (in Czech).
- Svoboda J., Jarošová L. and Drozdová E. (2000): The North Bohemian Mesolithic revisited: the excavation seasons 1998–1999. *Anthropologie*, Brno 38: 291–305.
- Svoboda J., Opravil E., Škrda P., Cílek V. and Ložek V. (1996): Mezolit z perspektivy regionu. Nové výzkumy v Polomených horách (Mesolithic from the regional perspective: new excavation in Polomené hory Mountains). *Archeologické rozhledy*, Praha 48: 3–15, 169–172 (in Czech).
- Svoboda J., Vašků Z. and Cílek V. (2003): Velká kniha o klimatu zemí koruny české. Regia, Praha, 605 pp. (in Czech).

REFLECTIONS

- Svobodová H. (1986): Pylová analýza z mezolitické vrstvy z Heřmánek I (Pollen analysis of the Mesolithic layer from Heřmánky I). Archeologické rozhledy, Praha 28: 288–290 (in Czech).
- Świerkosz K. (1994): Zbiorowiska roślinne Góry Chojnik – eksklawy Karkonoskiego Parku Narodowego. Część 1. Zbiorowiska leśne (Plant communities of Mt. Chojnik – an enclave of the Karkonosze Mts. National Park. Part I. Forest communities). Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody 13 (2): 17–56 (in Polish).
- Świerkosz K. (1999): Lista zbiorowisk roślinnych PNGS (A list of plant communities recorded within the PNGS area). In: M. Zgorzelski (ed.), Góry Stołowe (The Góry Stołowe Mountains). "Dialog" Press., pp. 128–130 (in Polish).
- Świerkosz K. (2000): The problems of synanthropisation of woody tropical flora. In: Bojarczuk T. and Bugała W. (eds.), Biodiversity versus synanthropisation of forest communities, Conference Papers of Polish Botanical Society, Wirty, pp. 62–63.
- Świerkosz K. (2004): Zróżnicowanie flory i szaty roślinnej Górz Stołowych (Differentiation of flora and plant communities of the Góry Stołowe Mountains). In: J. Fabiszewski (ed.), Wartości botaniczne wybranych pasm w Sudetach (Botanical value of some ranges of the Sudetes Mountains), Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Ser. B, 213, pp. 85–98 (in Polish).
- Świerkosz K. and Krukowski M. (2005): Main features of the sandstone flora and plant communities of the North-Western part of Sudetes Foreland. In: Ries C. and Krippel Y. (eds.), Sandstone Landscapes in Europe – Past, Present and Future, Proceedings of the 2nd International Conference on Sandstone Landscapes, Ferrantia 44: 127–132.
- Sykes M. T. and Wilson J. B. (1990): Dark tolerance in plants of dunes. Funct. Ecol. 4: 799–805.
- Sýkora T. (1975): Floristický příspěvek k základním krajinným celkům Hradčanské plošiny (Floristic contribution to the basic landscape units of the Hradčanská plošina Plateau). Preslia, Praha 47: 174–184 (in Czech).
- Sýkora T. (1983): Taxonomie a rozšíření bříz z okruhu *Betula alba* v Českém masivu (Taxonomy and distribution of birches from the *Betula alba* agg. in the Bohemian Massif). Zpr. Čs. Bot. Společ., Praha: 18: 1–14 (in Czech).
- Sýkora T. and Hadač E. (1984): Příspěvek k fytogeografii Adršpašsko-Teplických skal (Contribution to the phytogeography of the Adršpašsko-teplické skály Cliffs). Preslia, Praha 56: 359–376 (in Czech).
- Synowiec G. (1999): Ocena wytrzymałości mas skalnych dla celów geomorfologicznych i jej zastosowanie dla stoków piaskowcowych Górz Stołowych (Rock mass strength classification for geomorphological purposes and its application to sandstone slopes in the Góry Stołowe Mountains). Czasopismo Geograficzne 70(3–4): 351–361 (in Polish).
- Synowiec G. (2002): Rzeźba strukturalna Górz Stołowych w świetle klasyfikacji wytrzymałości mas skalnych (Structural relief of the Góry Stołowe Mountains in the light of rock mass strength assessment for geomorphological purposes). Acta Universitatis Nicolai Copernici, Geografia 32, Nauki Matematyczno-Przyrodnicze 109: 215–223 (in Polish).
- Szeląg Z. (2000): Rośliny naczyniowe Masywu Śnieżnika i Górz Bialskich (Vascular Plants of the Śnieżnik Massif and Bialskie Mts.). Fragm. Flor. Geobot. Polonica, Suppl. 3: 3–255 (in Polish).
- Szmajda P. (1979): Bryoflora Górz Stołowych i jej charakterystyka geobotaniczna (Bryoflora of the Góry Stołowe Mts. and its geobotanical characteristics). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Kom. Biol., Poznań 52: 1–79 (in Polish).
- Szwejkowski J. (1953): Mszaki Górz Stołowych cz. I. Wątrobowce (*Hepaticae*) (Mosses of Stołowe Mts. Part I. Liverworts, *Hepaticae*). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Kom. Biol., Poznań, 14 (5): 1–134 (in Polish).
- Tardif J., Conciatori F. and Bergeron Y. (2001): Comparative analysis of the climatic response of seven boreal tree species from northwestern Québec, Canada. Tree-Ring Research 57(2): 169–181.
- Taylor B. J., Burgess I. C., Land D. H., Mills D. A. C., Smith D. B. and Warren P. T. (1971): Northern England, British Regional Geology. Ed. 4, HMSO.
- Tendron G. (1983): La forêt de Fontainebleau, de l'écologie à la sylviculture. ONF, Fontainebleau, 96 pp.
- ter Braak C. J. F. and Šmilauer P. (1998): CANOCO reference manual and user's guide to CANOCO for windows. Software for canonical community ordination (version 4). Microcomputer Power, Ithaca.
- Thiry E., Stein R. and Cibien C. (1999): Cross-border biosphere reserves: new approaches in the cooperation between Vosges du Nord and Pfälzerwald. Nature Resources 35: 18–29.
- Thiry M. and Liron M. N. (2003): Micro-zones humides tourbeuses des platières gréseuses du Massif de Fontainebleau (77): hydrologie et biodiversité floristique. In: Le fil de l'Eau – Actes, C. Lécluse J. and Yvon (eds.), Ass. Scientifique pour la Géologie et ses Applications, Vandoeuvre-les-Nancy, pp. 157–167.
- Thiry M. and Maréchal B. (2001): Development of tightly cemented sandstone lenses in uncemented sand: example of the Fontainebleau Sand (Oligocene) in the Paris Basin. Journal of Sedimentary Research 71/3: 473–483.
- Thomas R. J., Schiele E. M. and Damberg D. T. (1990): Translocation in *Polytrichum commune* (Bryophyta). II. Clonal integration. Am. J. Bot. 77: 1569–1573.
- Thomas R. J., Schiele E. M. and Scheirer D. C. (1988): Translocation in *Polytrichum commune* (Bryophyta). I. Conduction and allocation of photoassimilates. Am. J. Bot. 75: 275–281.
- Tille J. (1905): Geschichte der Stadt Niemes. Niemes.
- Tbolewski Z. (1955): Porosty Górz Stołowych (Lichens of the Góry Stołowe Mts.). Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Prace Kom. Biol., Poznań 16(1): 1–99 (in Polish).

SANDSTONE LANDSCAPES


- Tokumasu S. (1978): Leaf litter fungi of the forests of *Pinus densiflora* and four introduced pines at Sugadaira, central Japan. *Trans. Mycol. Soc. Jpn.* 19: 383–390.
- Tokumasu S. (1996): Mycofloral succession on *Pinus densiflora* needles on a moder site. *Mycoscience*, Kyoto 37: 313–321.
- Tokumasu S. (1998a): Fungal succession on pine needles fallen at different seasons: the succession of interior colonizers. *Mycoscience*, Kyoto 39: 409–416.
- Tokumasu S. (1998b): Fungal succession on pine needles fallen at different seasons: the succession of surface colonizers. *Mycoscience*, Kyoto 39: 417–423.
- Tokumasu S. and Aoiki T. (2002): A new approach to studying succession on decaying pine needles in an oceanic subtropical region in Japan. *Fungal Diversity* 10: 167–183.
- Tokumasu S., Aoki T. and Oberwinkler F. (1994): Fungal succession on pine needles in Germany. *Mycoscience*, Kyoto 32: 29–37.
- Tokumasu S., Miura K. and Mikawa T. (1976): Distribution of saprophytic mucoralean fungi in the soils of natural and planted coniferous forests. *Trans. mycol. Soc. Jpn.*, Tokyo 17: 429–435.
- Topley W. (1875): The geology of the Weald. Memoir of the Geological Survey of Great Britain, London.
- Tricart J. and Cailleux A. (1972): Introduction to climatic geomorphology. Longmans, London.
- Trommler M. and Csaplovics E. (2006): Geoinformationsnetzwerke für die grenzüberschreitende Nationalparkregion Böhmisches- Sächsische Schweiz. In: Strobl J., Blaschke T. and Griesebner H. (eds.), *Angewandte Geoinformatik 2006*, Beiträge zum 18. AGIT-Symposium, Salzburg, Wichmann, Heidelberg, pp. 657–662.
- Tronkov D. (1998): Belogradchik rocks sculptures – a child of erosional powers of Nature and of geological controls. *Geologica Balcanica* 28(3–4): 153–158.
- Trunkó L. (2000): Ungarn. Bergland um Budapest, Balaton-Oberland, Südbakony. Sammlung Geologischer Führer 91. Borntraeger, Berlin-Stuttgart, 158 pp.
- Tucker M. (2000): Sedimentary petrology. Blackwell Science, Oxford.
- Tułaczyk S. (1992): Cuesta landscape in the middle part of the Sudetes Mts. *Geogr. Polonica* 62: 137–150.
- Turcotte D. L. (1997): Fractals and Chaos in Geology and Geophysics. Ed. 2., Cambridge University Press, Cambridge, 398 pp.
- Turek R. (1946): Prachovské skály na úsvitě dějin (The Prachovské rocks at the dawn of history). Praha (in Czech).
- Turkington A. V. (1998): Cavernous weathering in sandstone: lessons to be learned from natural exposure. *Quarterly Journal of Engineering Geology* 31: 375–383.
- Turner M. G. and Dale V. H. (1991): Modeling landscape disturbance. In: Turner M. G. and Gardner R. H. (eds.), Quantitative methods in landscape ecology, Springer, Berlin, New York, pp. 323–351.
- Tutin T. G., Burges N. A., Chater A. O., Edmondson J. R., Heywood V. H., Moore D. M., Valentine D. H., Walter S. M., Webb D. A. (eds.) (1993): *Flora Europaea. Vol 1. Psilotaceae to Platanaceae*. Ed. 2. Cambridge University Press, Cambridge.
- Twidale C. R. (1980): Origin of minor sandstone landforms. *Erdkunde* 34: 219–224.
- Twidale C. R. (2002): Two-stage concept of landform and landscape development involving etching: origin, development and implication of an idea. *Earth-Science Reviews* 57, 1–2, Elsevier Science: 37–74.
- Uličný D. (1997): Sedimentation in a reactivated, intracontinental, strike-slip fault zone: the Bohemian Cretaceous Basin, Central Europe. Proc. 18th Regional European Meeting of Sedimentology, Heidelberg, GAEA Heidelbergensis 3: 347.
- Uličný D. (2001): Depositional systems and sequence stratigraphy of coarse-grained deltas in a shallow-marine, strike-slip setting: the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. *Sedimentology* 48: 599–628.
- Uličný D. and Adamovič J. (1997): Sequence stratigraphy of tide-dominated sandbodies, Jizera Formation (Turonian), Bohemian Cretaceous Basin. Proc. 18th Regional European Meeting of Sedimentology, GAEA Heidelbergensis 3: 347–348.
- Ulrych J., Cajz V. and Adamovič J. (eds.) (1998): Magmatism and rift basin evolution. Excursion guide. Abstracts. Český geologický ústav, Praha, 98 pp.
- Usher M. B. (1988): Biological invasions of nature reserves: a search for generalization. *Biological Conservation* 44: 119–135.
- Valečka J. (1979): Paleogeografie a litofaciální vývoj severozápadní části české křídové pánve (Palaeogeography and lithofacies development in the NW of the Bohemian Cretaceous Basin). *Sbor. Geol. Věd, Praha* 53: 47–75 (in Czech).
- Valečka J. (1989): Sedimentology, stratigraphy and cyclicity of Jizera Formation (Middle-Upper Turonian) in the Děčín area (N Bohemia). *Vest. Ústř. Ústř. Geol., Praha* 64(2): 77–91.
- Valečka J. (ed.) (1997): České Švýcarsko. Geologická a přírodovědná mapa. Die Böhmisches Schweiz. Geologische Wanderkarte. Český geologický ústav, Praha.
- Van Maanen A. and Gourbière F. (1997): Host and geographical distribution of *Verticiladum trifidum*, *Thysanophora penicillioides* and similar fungi on decaying coniferous needles. *Can. J. Bot.* 75: 699–710.
- Van Maanen A. and Gourbière F. (2000): Balance between colonization and fructification in fungal dynamics control: a case study of *Lophodermium* on *Pinus sylvestris* needles. *Mycol. Res.* 104: 587–594.
- Van Vliet-Lanoe B. (1998): Frost and soils: implications for paleosols, paleoclimates and stratigraphy. *Catena* 34: 157–183.
- Vářilová Z. (2002a): A review of selected sandstone weathering forms in the Bohemian Switzerland National Park, Czech Republic. In: Příkryl R. and Viles H. (eds.), *Understanding and*

REFLECTIONS

- managing of stone decay (SWAPNET 2001), Charles University of Prague, The Karolinum Press, Prague, pp. 243–261.
- Vařilová Z. (2002b): Prozeleznění v pískovcích v Národním parku České Švýcarsko (Ferruginization of sandstones of the České Švýcarsko National Park). In: Adamovič J. and Cílek V. (eds.), Železivce, Pseudokrasový sborník 2 (Ironstones, Pseudokarst reports 2), Knihovna České speleologické společnosti, Praha, Vol. 37, pp. 53–56 (in Czech).
- Vařilová Z. (2002c): České Švýcarsko (Bohemian Switzerland). In: Adamovič J. and Cílek V. (eds.), Katalog vybraných významných geologických lokalit pískovcových oblastí. Železivce české křídové pánve (Catalogue of selected prominent geosites of sandstones landscapes – Ironstones of the Bohemian Cretaceous Basin), Knihovna České speleologické společnosti, Praha, Vol. 38, pp. 73–95 (in Czech).
- Veselý M. (1999): Stříbrné štoly u Jedlové (The “Silver mines” near Jedlová). Bezděz, Česká Lípa 8: 97–117 (in Czech).
- Veselý M. (2003): Stříbrné stěny u Hřenska (The “Stříbrné stěny Walls” near Hřensko). Speleofórum, Praha 20: 33–38 (in Czech).
- Vetterlein M. (1995): Southern Sandstone. Climbers’Club Guide.
- Věžda A. and Liška J. (1999): Katalog lišeňsků České republiky (A catalogue of lichens of the Czech Republic). Institute of Botany, Academy of Sciences of the Czech Republic, Průhonice (in Czech).
- Viles H. (2001): Scale issues in weathering studies. Geomorphology 41: 63–72.
- Vitek J. (1979): Pseudokrasové tvary v kvádrových pískovcích severovýchodních Čech (Pseudokarst forms in block sandstones of NE Bohemia). Rozpravy ČSAV, MPV, Praha 89(4): 1–57.
- Vitek J. (1981): Morfogenetická typizace pseudokrasu v Československu. Sborník Čs. geografické společnosti, Praha 89(4): 1–58 (in Czech).
- Vitousek P. M. (1988): Diversity and biological invasions of oceanic islands. In: Wilson E. O. and Peter F. M. (eds.), Biodiversity, National Academy Press, Washington D. C., USA, pp. 181–189.
- Vogel J. C., Jeřen S., Gibby M., Jermy A. C. and Ellis L. (1993): Gametophytes of *Trichomanes speciosum* (*Hymenophyllaceae*: *Pteridophyta*) in Central Europe. Fern Gaz., London 14: 227–232.
- Voigt T. (1994): Faziesentwicklung und Ablagerungssequenzen am Rand eines Epikontinentalmeeres – die Sedimentationsgeschichte der sächsischen Kreide. Ph. D. thesis, Fak. d. Geowiss., Geotechnik u. Bergbau d. TU Bergakad. Freiberg.
- Vrba J., Kněžek V. and Vrána M. (1965): Hydrogeologická rajónizace Československa – povodí Labe (Hydrogeological subdivision of Czechoslovakia – Elbe River basin). Ms., Geofond. Praha (in Czech).
- Wächter A. and Böhnert W. (eds.) (1998): Sächsische Schweiz. Landeskundliche Abhandlung. Natur-Mensch-Kultur. Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landesentwicklung/ Nationalparkverwaltung Sächsische Schweiz, Bad Schandau, 279 pp.
- Wagenknecht S. (1999): Untersuchungen zum Aufbau digitaler Geländemodelle aus Laserdaten in der Sächsischen Schweiz. Diploma thesis, Institute of Photogrammetry and Remote Sensing, University of Dresden.
- Walczak M. et al. (1993): Polska mapa ochrony przyrody (Polish map of nature conservation). Map 1 : 750 000. Instytut Ochrony Środowiska, Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictwa Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, Warszawa & Wrocław (in Polish).
- Walczak W. (1963): Geneza form skalnych na północno-wschodniej krawędzi Górz Stołowych (Origin of tors on the north-eastern edge of the Góry Stołowe Mountains). Acta Universitatis Wratislaviensis, 9, Studia Geograficzne 1: 191–199 (in Polish).
- Walker R. G. and James N. P. (eds.) (1992): Facies models. Response to sea level change. Geol. Assoc. Canada, St. John’s.
- Wäreborn I. (1969): Land molluscs and their environments in an oligotrophic area in southern Sweden. Oikos 20: 461–479.
- Warke P. A. and Smith B. J. (1998): Effect of direct and indirect heating on the validity of rock weathering simulation studies and durability tests. Geomorphology, Elsevier 22: 347–357.
- Weber D. (1985): Festung Königstein. Ed. 25, Dresden.
- Weinitschke H. (1980): Naturschutz gestern – heute – morgen. Urania Verlag, Leipzig – Jena – Berlin, 104 pp.
- Wendel G. W. and Smith H. Clay (1990): *Pinus strobus* L. eastern white pine. In: Burns R. M. and Honkala B. H. (eds.), Silvics of North America. Vol. 1. Conifers. Agriculture Handbook 654, U. S. Department of Agriculture, Forest Service, Washington D. C., pp. 476–488.
- Werner J. (1998): La bryoflore de la Petite-Suisse Luxembourgeoise, un bilan de synthèse. Bull. Soc. Nat. Luxemb. 99: 3–27.
- Westwood J. (1997): Sacred Journeys. Paths for the New Pilgrim, Gaia Books Limited, London, 224 pp.
- Whiteley D. (ed.) (1985): The natural history of the Sheffield area. Sorby Natural History Society.
- Whittaker R. H. (1972): Evolution and measurement of species diversity. Taxon 21: 213–251.
- Widden P. and Parkinson D. (1973): Fungi from Canadian coniferous forest soils. Can. J. Bot. 51: 2275–2290.
- Wieland E. and Stumm W. (1998): Dissolution kinetics of kaolinite in acidic solutions at 25 °C. Geochim. Cosmochim. Acta 56: 3339–3355.
- Williams R. B. G. (1997): Geomorphological and pictorial evidence of environmental change at Wealden sandstone sites. In: Jackson A. and Flanagan M. (eds.), Conservation of cryptogams in the Weald, Proceedings of the Cryptogam Workshop, Royal Botanic Gardens, Kew, pp. 52–54.
- Williams R. B. G., and Robinson D. A. (1981): Weathering of

SANDSTONE LANDSCAPES

- sandstone by the combined action of frost and salt. *Earth Surface Processes and Landforms* 6: 1–9.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (1985): The effect of surface texture on the determination of the surface hardness of rock using the Schmidt Hammer. *Earth Surface Processes and Landforms* 8: 289–292.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (1989): Origin and distribution of polygonal cracking of rock surfaces. *Geografiska Annaler* 71A: 145–159.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (1994): Weathering flutes on siliceous rocks in Britain and Europe. In: Robinson D. A. and Williams R. B. G. (eds.), *Rock Weathering and Landform Evolution*, Wiley and Sons, Chichester, pp. 413–432.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (1998): Weathering of sandstone by alunogen and alum salts. *Quarterly Journal of Engineering Geology* 31: 369–373.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (2000): Effects of aspect of weathering: anomalous behaviour of sandstone gravestones in southeast England. *Earth Surf. Process. Landforms* 25: 135–144.
- Williams R. B. G. and Robinson D. A. (2001): Experimental frost weathering of sandstone by various combinations of salts. *Earth Surf. Process. Landforms* 26: 811–818.
- Williams R. B. G., Swantesson J. O. H. and Robinson D. A. (2000): Measuring rates of surface downwearing and mapping microtopography: The use of micro-erosion meters and laser scanners in rock weathering studies. *Z. Geomorph. N. F.*, Berlin & Stuttgart, Suppl. 120: 51–66.
- Wilson J. B. and Sykes M. T. (1999): Is zonation on coastal sand dunes determined primarily by sand burial or by salt spray? A test in New Zealand dunes. *Ecol. Lett.* 2: 233–236.
- Winkler E. M. (1994): Stone in Architecture. Properties, Durability, Springer-Verlag, 313 pp.
- Wojewoda J. (1986): Fault scraps induced shelf sand bodies in Upper Cretaceous Intrasudetic Basin. In: Teisseyre A. K., 7th IAS European Meeting Excursion Guidebook, Exc. A-1.
- Wojewoda J. (1997): Upper Cretaceous littoral-to-shelf succession in the Intrasudetic Basin and Nysa Trough, Sudety Mts. In: Wojewoda J. (ed.), Obszary Źródłowe: zapis w osadach, wyd. Wind, Wrocław, pp. 81–96.
- Woźny M. and Czajka M. (1985a): *Bathyphantes eumenis* (L. Koch, 1879) (Aranei, Linyphiidae) in Poland, and its synonyms. *Polskie pismo entom.* 55: 575–582.
- Woźny M. and Czajka M. (1985b): Pająki *Lepthyphantes pulcher* (Kulczyński) (Linyphiidae) i *Raebothorax morulus* (O. P.-Cambridge) (Eriginidae) w Górzach Stołowych (Spiders *Lepthyphantes pulcher* (Kulczyński) (Linyphiidae) and *Raebothorax morulus* (O. P.-Cambridge) (Eriginidae) in the Stołowe Mts.). *Przegląd Zoologiczny* 29: 167–169 (in Polish).
- Wray A. L. (1999): Opal and chalcedony speleothems on quartz sandstones in the Sydney region, southeastern Australia. *Australian Journal of Earth Sciences* 46: 623–632.
- Wray R. A. L. (1997): A global review of solutional weathering forms on quartz sandstones. *Earth Science Reviews* 42(3): 137–160.
- Wyckoff J. (1999): *Reading the Earth. Landforms in the making.* Adasta West Inc., Mahwah.
- Yanev Y. (1987): Characterisation of volcanic glasses from the Eastern Rhodopes, Bulgaria. 2nd Intern. Conf. on Natural Glasses, Ed. UK Praha, 129–138.
- Yano E., Matsuo K., Shiyomi N. and Andow D. A. (eds.) (1999): Biological invasions of ecosystem by pests and beneficial organisms. National Institute of Agro-Environmental Sciences (NIAES) Tsukuba.
- Young R. and Young A. (1992): *Sandstone landforms*. Springer-Verlag, Berlin.
- Young R. W. (1986): Tower Karst in Sandstone: Bungle Bungle massif, northwestern Australia. *Z. Geomorph.*, Berlin-Stuttgart N. F. 30(2): 189–202.
- Zagorcev I. (1995): Pirin. Geological guidebook. Academic publishing house “Prof. M. Drinov”, 70 pp.
- Zahálka Č. (1916): Severočeský útvář křídový z Rudohoří až pod Ještěd (Northern Bohemian Cretaceous formation from Rudohoří to Ještěd). Published by autor, Roudnice n. L., 98 pp. (in Czech).
- Žák K., Ložek V., Kadlec J., Hladíková J. and Cílek V. (2002): Climate-induced changes in Holocene calcareous tufa formations, Bohemian Karst, Czech Republic. *Quaternary International* 91(1): 137–152.
- Zemanek B. (1991): Mountain taxa versus xerothermic taxa in the Polish East Carpathians and their indicatory value in phyto-geographical investigations. *Zesz. Nauk. Uniwersyteckich Pr. Bot.*, Kraków 22: 55–80.
- Zimerman V., Randus P. and Piller J. (1996): Jeskyně, skalní hrádky a mlýny Kokořínska (Caves, rock castles and mills of the Kokořínsko Region). Mělník, 39 pp (in: Czech).
- Zittová-Kurková J. (1984): Bryophyte communities of sandstone rocks in Bohemia. *Preslia*, Praha 56:125–152.
- Zólyomi B. (1950): Fitocenozi i lesomelioracii obnazsenii gor Budü (Phytocoenosis and reafforestation of bare land in Budü Mountains). *Acta Biologica Acad. Sci. Hung.* 1: 7–67 (in Russian).
- Zozulin G. M. (1992): Lesa Nijnego Dona (The Forests of Low Don). Rostov na Donu, pp. 122–134.
- Zvelebil J. (1985): Time prediction of a rock fall from a sandstone rock slope. In: Proc. 4th Int. Symp. on Landslides 3, Toronto University Press, Toronto, pp. 591–596.
- Zvelebil J. (1988): Rhythmic patterns of rock fall evolution in NW Bohemia. Proc. 5th Int. Symp. on Landslides 8, A. A. Balkema, Rotterdam: pp. 803–809.
- Zvelebil J. (1989): Inženýrskogeologické aspekty vývoje skalních



REFERENCES

- svahů v Děčínské vrchovině (Engineering-geological aspects of the development of rock slope development in Děčín Highland). CSc. thesis, ÚGG ČSAV, Praha, 282 pp. (in Czech).
- Zvelebil J. (1995): Determination of Characteristic Features of Slope Movements Present-day Activity by Monitoring in Thick-bedded Sandstones of the Bohemian cretaceous basin. *Acta Universitatis Carolinae, Geographica*, Prague, Suppl., 79–115.
- Zvelebil J. (1996): A Conceptional Phenomenological Model to Stability Interpretation of Dilatometric Data from Rock Slope Monitoring. In: Seneset K. (ed.), *Landslides, Proc. VIIth Int. Symp. on Landslides*. Balkema, Rotterdam, pp. 1473–1480.
- Zvelebil J. and Moser M. (2001): Monitoring Based Time-prediction of Rock Falls: Three Case Histories. *Phys. Chem. Earth (B)*, Elsevier 26(2): 159–167.

